


Sur les parties de l'organe
pendant l'opération


Paris le 22 Xbre 1791.

q. 208

ARC 50 n° 182



Observations sur les pertes utérines pendant L'Accouchement à Terme.



De tous les accidents qui peuvent troubler l'opération naturelle de l'accouchement, il n'en est point de plus urgent, et souvent de plus funeste, que la perte utérine. comme les livres élémentaires ne contiennent à cet égard, que quelques principes, et quelques observations isolées, nous avons cru qu'il étoit intéressant pour l'humanité, de rassembler assez de faits, qui puissent indiquer les différentes ressources, que l'art dans cette circonstance peut fournir à la nature. puissent les détails ou nous allons entrer, être susceptibles de l'attention de la Société savante à laquelle nous soumettons l'examen.

Plusieurs causes peuvent donner lieu aux pertes utérines. en effet ou l'hémorragie qui se manifeste pendant l'accouchement arrive chez une femme pléthorique, ou elle est la suite d'efforts inconsiderés, ou de quelques mouvements violents de l'âme, qui ont trouble l'action de la matrice, et causés le détachement d'une portion du placenta, ou bien elle est due à la mauvaise situation de celui-ci, ou à la rupture de quelques vaisseaux engorgés du Chorion, ou même à quelque affection de la matrice, telle que la déchirure de son orifice, ou la rupture d'une des parties de son corps, ou bien enfin elle est due à la disposition vicieuse du cordon ombilical.

Dans ces différentes circonstances, les causes ne sont pas les mêmes, et les secours à employer doivent conséquemment varier, non seulement relativement à leur nature, mais encore relativement à l'intensité de l'hémorragie, et à l'état de l'accouchement. en effet, ou la perte est modique, ou abondante, et elle survient dès

2 Le commencement du travail, et avant que les membranes soient rompues, ou bien elle se manifeste, lorsque le travail est déjà commencée, lorsque les fibres ont dilaté, ou ^{disposées} à une facile dilatation, et lorsque les liquides sont coulés dans les premières cas, c'est-à-dire lorsque la perte est légère, lorsqu'elle survient dès le commencement du travail, lorsqu'elle est la suite de la rarefaction des humeurs, ou de l'accélération de leur mouvement, causées soit par quelque trouble violent de l'âme ou du corps, ou par la pléthore de l'individu, dans ces cas, il n'est pas douloureux, qu'une saignée en diminuant le volume du sang, ne puisse arrêter la force de son impulsion vers les vaisseaux de la matrice, ~~en diminuant la circulation~~, et ne puisse ainsi modérer et même arrêter l'hémorragie, surtout si l'on recommande en même temps le repos le plus parfait et la situation horizontale dans le lit, parcequ'en modérant ainsi les opérations de l'âme et du corps, on favorise une distribution uniforme des liqueurs dans toute la Machine. mais faut-il ajouter à ces précautions, celle que recommandent plusieurs accoucheurs, et qui consiste à exposer la poitrine, la tête, et les extrémités de la malade, à l'action subite du froid? ce moyen ne peut paroître que désavantageux, si l'on fait attention, que le sang ne pouvant alors aborder librement aux extrémités artérielles, à raison de la crispation qui arrive à la surface du corps, doit nécessairement refluer vers le centre, et vers la partie sur laquelle on veut modérer son irruption. il est donc plus convenable de tenir la femme selon la saison, de manière à ce que la chaleur naturelle ne soit pas subitement réprimée, ou plutôt de manière à ce qu'elle soit assez modérée, pour que la circulation puisse se faire librement. c'est par la même raison, que nous ne croyons pas aussi avantageuses qu'on le pense communément, les aspersions subites et considérables d'eau froide sur le visage et sur le corps, et les applications répétées de linges imbibés de la même liqueur, ou d'un vinaigre, sur les reins et sur le ventre, parcequ'en refroidissant trop promptement ces parties, et en resserrant ainsi les vaisseaux capillaires, on chasse subitement dans les cavités intérieures, tous les liquides qui circulent dans les vaisseaux extérieurs, on les dispose ainsi à affluer, ou au moins à séjourner dans l'endroit où l'on desirait

ralentir leur cours, et l'on fait conséquemment le contraire de ce que l'on vouloit
opérer; d'ailleurs, que la porte devint souvent beaucoup plus abondante, ainsi que
nous l'avons vu arriver dans plusieurs circonstances, parmi les quelles nous
citerons la suivante.

au mois de jbre 1782. j'étais appelé vers six heures du soir chez M^{lle} P.
parvenue au terme de la gestation. depuis quelques heures elle éprouvait quelques legers
coliques, et venait de se mettre audit à raison d'une porte qui lui était survenue à la suite
d'une chute de dessus une chaise. m'étant mis en devoir d'examiner son état, je trouvais dans
le vagin deux à trois petits caillots de sang. l'orifice de la matrice était à peine dilaté de la
grandeur d'une pièce de six sols. ses bords étaient épais et assez gorgés. comme il ne s'écoulait
de la matrice que très peu de sang, que les douleurs utérines étoient très faibles, et très éloignées
les unes des autres, et que ~~le pouls~~ ^{le pouls} de la malade d'un très bonne constitution, ~~était~~ ^{était} grand, plein
et dur, je me bornai à la saignée du bras, à lui recommander le repos le plus parfait audit,
de s'y tenir légèrement couverte, d'y observer la situation horizontale, et je prescrivis l'adette
et pauvre boisson helait d'amarandes nigrés. étant resté auprès de cette dame environ deux
heures, et observant que les douleurs étoient très legères, et ne revenaient qu'à de très longs
intervalles, sans que l'hémorragie continuât, jela quittai un moment pour terminer
quelques visites. dans cet intervalle, la belle soeur de la malade, voulut aussi donner
son avis, et lui conseilla de se faire entourer le ventre et les reins d'un drap trempé dans
l'eau froide et le vinaigre, l'assurant que ce moyen prévenirait le retour de l'hémorragie,
et que son aïeul l'avait employé avec avantage dans une saignée contre laquelle
avait couru. ce conseil fut suivi, mais à peine fut-il exécuté, que la malade fut prise
d'un frisson considérable, et s'aperçut que l'hémorragie avait reparu avec abondance.
ayant été aussitôt rappelée, mon premier soin fut de débarrasser cette dame de ses
linges mouillés, et de substituer de très secs. comme elle ressentait un très grand froid
aux extrémités, jela fis couvrir et envelopper de flanelles bien chauffées, qui rappelleraient
peu à peu la chaleur. ayant trouvé d'ailleurs que l'hémorragie était médiocre, et que
la dilatation de l'orifice, n'était pas plus avancée que je ne l'avais trouvée d'abord, je
me bornai à me servir d'un tampon de m^r lebour, afin d'opposer unedigue au sang,
de favoriser la contraction de la matrice, et de donner à l'orifice le temps de se dilater.

par ce moyen la perte s'arresta, bientôt les douleurs s'approchèrent, et devinrent assez vives au bout de deux heures pour chasser l'étampou et quelques caillots de sang. l'orifice utérin se trouvant alors dilaté d'un pouce de six livres, et la tête se présentant, j'écartai les membranes, afin de favoriser le relâchement le plus parfait de la matrice, et prévenir la continuation de l'hémorragie qui ne reparut plus. les douleurs utérines n'ayant pas discontinuées devinrent de plus en plus énergiques, et terminèrent l'accouchement au bout de deux à trois heures. la perte s'étant renouvelée avec abondance après la sortie de l'enfant, je portai aussitôt la main dans la matrice qui était dans l'inertie, je remarquai que le placenta qui était en raquette, était décollé dans la partie inférieure, d'environ la largeur d'un pouce de six livres. j'en fis l'extraction assez facilement, en prenant la précaution, de frapper assez fortement le ventre de l'accouchée, et de contenir avec une main le corps de la matrice, tandis qu'une des doigts qui me servaient à extraire le placenta, je cherchais à agacer l'orifice et la paroi interne de l'utérus, dont la contraction ne tarda pas, et mit bientôt fin à l'hémorragie, et contribua efficacement à l'expulsion du placenta.

De l'arrière-faix.

Nous pourrions citer plusieurs exemples de l'avantage du seul repos au lit, dans les cas de perte utérine, pendant les différents stades de la gestation, ayant besoin d'y faire garder la position horizontale et le repos le plus parfait, de modérer la chaleur, et de saigner lorsqu'il y a signe de pléthore, et surtout lorsque l'hémorragie n'est pas abondante. cependant qu'on n'ait pas voulu de ces faits, qu'on nous prescrivions entièrement l'usage des rafraîchissants. il est hors de doute que l'abstinence qu'ils occasionnent peut se communiquer à la matrice, et causer dans ses fibres un resserrement avantageux. mais nous pensons qu'il est ~~assez~~ ^{plus} convenable de procurer cet effet d'une manière douce et uniforme, et la moins susceptible d'inconvénient. Hippocrate nous a depuis longtemps tracé la véritable route, en conseillant dans les cas de perte utérine. de prendre une éponge imbibée d'eau froide, et d'en humecter la région ombilicale. par ce moyen on ne fait couler sur la région hypogastrique, qu'une certaine quantité d'eau froide, dont la sensation légère et modérée, mais toujours continuée uniformément, dispose les vaisseaux utérins à se resserrer insensiblement et s'arrêter.

et empêche les liqueurs d'être portées trop subitement dans les vaisseaux intérieurs. ^{de cette méthode}
L'avantage que nous ~~avons~~ retiré dans notre pratique, nous porte à lui conseiller de préférence
à celle qui est ordinairement suivie. son succès sera encore plus certain, si l'on fait en même tems
usage d'un tampon de m^r. le Hour, c'est-à-dire si l'on introduit dans le vagin jusqu'à l'orifice ^{de la matrice}
plusieurs lambeaux de linge, de coton ou de coton imbibés d'eau et de vinaigre. leurs effets sont
doublement avantageux, parceque d'une part la présence de ce tampon, et la vapeur du vinaigre dans
il est impregné, en irritant la matrice, l'oblige à se contracter, et à resserer ainsi les vaisseaux
qui fournissent à l'hémorragie, tandis que d'une autre part ce tampon appliqué sur l'orifice de
la matrice, occupant le vagin s'oppose à l'écoulement du sang, en favorisant de brèche
en proche un caillot, qui se prolongeant jusqu'à l'intérieur de l'utérus, augmente
par sa présence l'irritation, et détermine ainsi la contraction, et l'avouchement.

C'est dans l'ouvrage estimable et estimé de m^r. le Hour que l'on trouvera les preuves
réitérées de l'utilité de ce moyen employé avec le même succès par suellie et Hoffmann (A) en
consultant les ouvrages de ces auteurs, l'on y verra qu'il a presque toujours réussi à arrêter
l'hémorragie, pendant que les douleurs utérines se modifient paisiblement, que l'orifice
se dilate peu à peu, et qu'enfin des contractions plus vives ont chassé quelque fois le fœtus et
le tampon. cependant comme l'on est le plus souvent obligé d'ôter ce dernier pour le progrès
du travail, et qu'il s'est quelque fois trouvé assez détaché et assez durci pour causer
de la douleur lorsqu'il a fallu l'extraire, d'ailleurs comme il est pénible pour la femme
d'introduire à différentes reprises dans le vagin, plusieurs boules de linge, de coton ou de
affin qu'ils puissent le remplir avec exactement, et faire la compression nécessaire, nous
préférons pour éviter ces désagréments de faire avec les deux premières boules de ce linge ou de
coton appliquées à l'orifice avec une éponge imbibée d'eau et de vinaigre, et traversée d'un
fil, dont les extrémités se trouvent à la vulve, parceque cette éponge en se gonflant par
l'humidité, comprime et bouche aussi exactement que d'autres lambeaux de linge, l'orifice
de la matrice et le vagin, et qu'on peut l'extraire avec plus de facilité quand il est nécessaire
en tirant sur les fils qui la traversent. cependant lorsque l'orifice utérin est très-pénétirable
et que les douleurs sont très-légères, ^{et chassées} éloignées les unes des autres, pour ne pas faire espérer
un prompt avouchement, aux différents moyens que nous venons d'exposer, on doit encore

(A) suellie obs. ij. tom. 2. page 208. l'histoire d'une femme atteinte d'une fièvre violente, qu'on n'avait pu arrêter par les moyens
ordinaires; il fut le precepte d'Hoffmann, remplit le vagin de fines etouppes trempées dans le vinaigre, ce qui arrêta
le flux de l'hémorragie. les douleurs devinrent ensuite si violentes, qu'elle chassa le tampon, et un petit avorton.
depuis cet événement, ajoute cet auteur, j'ai employé avec beaucoup de succès la même méthode.

6 en ajoutées d'autres non moins utiles, tels que les bois froids rafraichissants, et les Narcotiques.
 ceudei cependant ont para contraires à quelques praticiens, et ~~ffhat~~ Hoffmann et plusieurs
 autres auteurs, disent avoir remarqué qu'ils étoient capables et augmentaient la circulation.
 mais ces effets ne nous paroissent devoir être attribués qu'à la diminution de l'irritabilité
 et à l'affoiblissement de la contractilité des vaisseaux, que ces remèdes procurent, & ou
 il doit s'ensuivre que toutes les fois que l'on en fera usage, lorsque le mouvement des
 fluides sera empêché par la résistance des solides, ils favoriseront alors d'autant plus
 la circulation, qu'ils auront diminuée d'avantage les résistances. Mais il n'en est plus
 ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'excès, et lorsque les solides se trouvent déjà relâchés ou
 affoiblis, ainsi qu'il arrive ^{lors d'une} ~~par une~~ hémorrhagie. en effet les forces motrices du sang
 et des vaisseaux venant alors à être encore plus diminuées par l'effet des Narcotiques,
 n'ont plus la faculté de réagir avec autant d'énergie sur les fluides, et de la diminution
 ou au moins la modulation de la circulation. c'est par cette raison sans doute, qu'une
 trop grande dose d'opium, cause ordinairement la mort, en affoiblissant les forces
 vitales au point de les détruire totalement, et c'est pourquoy ^{sans doute} ~~on~~ Boerhaave s'abstenait
 de donner l'opium dans le commencement des maladies aiguës, et lorsque les forces vitales
 jouissoient de toute leur énergie, afin d'éviter une plus grandeurgence des humeurs,
 et qu'il ~~les~~ administrait au contraire, lorsque ces mêmes forces avoient été suffisamment
 diminuées auparavant, par les évacuations nécessaires. au reste quelque soit la manière
 d'envisager l'effet des Narcotiques, mille faits attestent qu'ils ont la faculté de diminuer
 l'irritabilité, ils n'ont pas moins la propriété éminente de diminuer la sensibilité
 et de porter le calme le plus parfait jusques dans les parties les plus éloignées. hors tout
 raisonnablement croire qu'une femme attaquée de peste utérine, n'est pas plus
 ou moins troublée par la crainte qu'elle inspire son état. ce trouble n'affecte-t-il
 pas principalement le genre nerveux, et l'irritation de celui-ci, ne doit-il pas agir et
 influencer sur l'action des solides, et le mouvement des fluides, et conséquemment
 augmenter encore l'hémorrhagie. quels Moyens sont plus puissants et plus capables
 de calmer et d'arrêter ce désordre. que les Narcotiques. Pour moi dit Burgius (A) j'ai souvent
 employé l'opium avec succès dans les hémorrhagies, et dans les pertes des femmes. Boerhaave
 (B) s'alliait aux astringents et prescrivait chaque deux heures une demi once de la mixture suivante
 ℞. pierre hématite, Bole arménie, sang de dragon aa ℥j. sirop de Myrthe ℥j. q'm
 gr. j. caudistillée de plantain ℥ss. Sincelle se joint tout de donner le laudanum
 liquidé de Sydenham uni à la teinture de roses de Provins, et ses observations nous offrent

(A) epib. germ. dec. 2. an. g. obs. 152. Page 283.

(B) aphor. sect. 130x. Page 192.

plusieurs preuves de ses bons effets.

Si il nous est permis de mêler notre opinion à celle de ces grands hommes, nous avouerons que peu suffisants dans les effets des astringents pris intérieurement, et les croyant au moins inutiles, nous préferons ~~à~~ nous servir de la potion suivante. $\mathcal{R}$. infusion de tilleul $\mathcal{Z}$ $\mathcal{V}$. sirop d'opium fait de la manière dont Mr Baumez recommande $\mathcal{Z}$ $\mathcal{V}$. ajoutez et faites fondre sel de nitre $\mathcal{Z}$ $\mathcal{V}$. nous employons ^{quelquefois} ce dernier Médicament tant parce qu'il peut être compté au nombre des Meilleurs tempérants, que parce qu'il a été des Meilleurs Patients, il a la vertu de corriger les qualités nuisibles des Narcotiques. Souvent nous partageons cette potion en deux doses à prendre à deux heures d'intervalle, et nous pouvons assurer qu'en nous en avons toujours fait l'usage le plus avantageux, surtout lorsqu'elle pléthore et l'irritabilité avaient été déjà diminuées. avertis les Narcotiques sont surtout nécessaires, lorsque la perte est la suite de quelques Mouvements violents de l'âme, parce qu'alors il s'agit principalement de Moderer, & de calmer les passions qui ont déterminé l'hémorragie. Dans ce dernier cas on doit être très circonspect sur l'usage de la saignée, et en général elle ne peut être déterminée que par les forces de la femme et par la plénitude de son poulx. mais quand l'hémorragie est abondante, de quelque cause qu'elle provienne, ou lorsqu'elle existe depuis un certain tems, cette évacuation doit être absolument rejetée, parce qu'elle ne peut remédier à l'accident, et qu'elle peut au contraire en augmenter le danger, en diminuant les forces intrinsèques de la Malade, souvent au point d'être à la nature de saignée d'agir avec succès.

à l'appui de ces préceptes, il n'est point d'auteurs qui ne puissent citer plusieurs faits qui démontrent l'utilité des saignées que nous venons de proposer, sans nous y arrêter ainsi qu'à plusieurs autres moyens dont l'efficacité ou l'inutilité ont été abandonnées à l'usage, nous nous bornerons à observer que c'est que dans le cas ou l'époque de la gestation est arrivée, ou lorsque l'hémorragie est assez abondante pour mettre la Malade en danger, qu'on doit faire usage du tampon en effet si on l'emploie dans le cas ou avant la termin de la grossesse, il arrive communément que l'irritation qu'il procure à la Matrice, de même le plus souvent la contraction, et l'avortement. c'est un fait qui résulte des observations mêmes de Mr Lefebvre, et que nous avons observé dans la pratique, car nous n'avons jamais pu éloigner l'avortement, toutes les fois que nous nous sommes servis de ce moyen, ou que nous l'avons vu employer, tandis que souvent la grossesse est parvenue à terme, lorsqu'on n'a opposé à l'hémorragie que le repos parfait, le lait, les boissons rafraichissantes, et invraisemblables, les apertures modérées de saignée, les Narcotiques, et quelquefois la saignée.

4 quoiqu'il en soit, au lieu d'un pou et des autres moyens dont nous venons
 de parler, n'aurait-il pas plus d'avantages, surtout lorsque l'hémorragie est
 abondante d'employer la méthode de M. Puzos, (A) et ne conviendrait-il pas mieux de
 dilater par degrés l'orifice utérin, afin de faire naître successivement les contractions de
 la matrice, de faire prononcer les Membranes, et de les déchirer aussitôt, afin que
 l'écoulement des eaux en procurant un vuide dans l'utérus, permette à ses fibres
 d'être resserrées plus intimement, et graduellement sur le corps du fœtus, de manière qu'il
 puisse avancer plus promptement dans l'orifice, et que les vaisseaux qui le forment
 puissent se resserrer, et être en même temps plus parfaitement comprimés.
 L'hémorragie puisse se resserrer, et être en même temps plus parfaitement comprimée.
 en rendant hommage aux talents, et aux Vies ingénieuses de M. Puzos, qu'il nous soit
 permis d'observer que ce procédé ne peut être utile, ou ne l'est effectivement qu'autant
 qu'on trouve l'orifice utérin disposé à se dilater facilement, ou lors qu'il l'est déjà
 suffisamment pour permettre de déchirer les Membranes. en effet il arrive souvent que
 l'orifice utérin est si rigide, si épais et si engorgé, qu'il offre les plus grandes résistances,
 et qu'on s'exposerait alors, ou à ne pas réussir à opérer la dilatation, ou qu'on est
 obligé d'employer des efforts capables de déterminer des congestions inflammatoires
 dont les suites peuvent être dangereuses et même mortelles. cette affection n'est
 point sans fondement. M^{lle} (B) appelée auprès d'une femme prise d'hémorragie
 et trouvant les eaux écoulées, et le bras de l'enfant qui se présentait, ~~enveloppé~~ semit
 aussitôt en devoit déterminer l'avortement mais il ne put parvenir à dilater l'orifice
 de la matrice quoiqu'il fut déjà ouvert d'environ un pouce et demi de largeur, et
 quoiqu'il employât à différentes reprises les plus grands efforts. dans cet état il se décide
 à couper l'orifice avec des ciseaux ce qui lui donna la facilité de pénétrer dans la
 matrice et de retirer l'enfant qui était mort. la mère ayant aussi succombé les jours
 de sa couche à une fièvre et un écoulement considérables, M^{lle} termine son
 observation par les réflexions suivantes: « j'en ai cependant réflexion après que comme
 la malade n'avait pas perdu beaucoup de sang, j'aurais dû attendre plus long temps, pour
 permettre aux douleurs de pousser les épaules en bas, et par là, de dilater davantage les parties.
 il n'y a aucun lieu de douter quels violents efforts que j'employai pour faire la dilatation
 et ensuite la dernière dilatation qui suivit l'introduction de ma main, est ce qui a causé
 l'inflammation, le froid et la fièvre, tous accidents qui se sont terminés par le dévoiement.
 avertis sans chercher à deviner ici les variations qui se remuent dans le développement
 de la matrice pendant la grossesse, nous remarquerons qu'il n'est point d'avortement qui
 puisse venir que le col utérin, au lieu de se trouver développé vers la fin de la gestation,
 et assez relâché par la quantité d'humours qui l'abreuvent ordinairement à cette époque

(A) Mémoire sur les pertes utérines inséré dans le 2^e volume des Mémoires de l'Académie de Chirurgie
 (B) M^{lle} obs. XVI. tome 3^e page 359.

et nous au contraire quelquefois augmenté de longueur et d'épaisseur, ne manquant jamais
 commencement du travail, il est encore long d'un demi pouce, et que le Muscainc tombe,
 loin d'être confondu avec l'orifice interne, se trouve au contraire alors peu ou point ouvert
 en sorte qu'il est impossible d'atteindre aux membranes. quelque fois même cet orifice interne
 quoique le col utérin s'écrive effacé, est constitué de fibres si rigides, et si peu disposées
 à s'étendre, qu'il arrive souvent qu'il ^{se résiste tellement} ~~ne parvient pas~~ aux contractions utérines, ou aux
 efforts qu'on emploie pour le dilater, qu'il se déchire au lieu de se dilater. Sans multiplier
 les faits multipliés de ces vérités, nous observerons que Puzos lui même avoue dans une de ses
observations, qu'il fut plus d'une heure à travailler sur l'orifice et sur les Membranes avant
de parvenir à le dilater, et à les percer. Smellie remontrant les mêmes difficultés
fut obligé de se servir d'un moyen particulier pour les ouvrir. Malgré les différentes
 tentatives que je pus faire. dit cet excellent accoucheur (A) il ne me fut pas possible de
 rompre les membranes. pour cet effet à mesure que je dilatais l'orifice en tirant, pendant
 chaque douleur, j'avais le plus qu'il était possible ma main dans le vagin, et
 allongeais mon doigt, jusqu'à ce qu'il pouvait s'étendre, mais voyant que cet expédient
 ne me réussait point, j'introduisis un cathéter Semelle, que j'enfonçai à travers le
 du col utérin et de l'annus au moyen de quoi les eaux s'élevèrent en grande quantité, et
 le hémorrhagie s'arrêta immédiatement après. R.

Ce Procédé tout ingénieux qu'il soit, peut devenir d'angereux dans des Mains
 moins exercées; et moins sûres que celles de Smellie, parce qu'il peut arriver que l'instrument
 blesse la tête du fœtus, qui est ordinairement appliquée sur les Membranes, et cet accident
 ne pourrait fortot manquer d'arriver, lorsqu'il y aurait très peu d'eau interposée
 entre elles. Smellie lorsque l'évacuation des eaux est si prématurée, et que le col utérin
 avant que l'orifice utérin soit disposé à s'étendre, s'est par là que le travail languisse
 et que l'accouchement soit long et très pénible, non seulement parce que les Membranes
 ne pouvant plus à la dilatation de l'orifice par leur compression deus et gradées, la
 matrice ne peut se contracter aussi promptement, mais encore, parce qu'elles, avant
 l'écoulement des eaux, et avant l'écoulement des eaux, quelques fois après long temps l'écoulement des
matrices, si l'on ne cherche à le aider par des touchers répétés, et des dilatations forcées, finissent
 toujours Dangereuses, au moins toujours fatigantes, et douloureuses pour la femme,
pour l'enfant, et pour le médecin, lorsqu'il s'agit de les percer, et d'en faire l'écoulement,
que nous leur proposons, et lorsque les membranes sont aussi épaisées et aussi rigides,

Donnement que je pris un drap sec, cela débarrassant ceux qui étaient malades, et
je lui fis envelopper les extrémités d'un morceau de linge bien chauffé, je prenais
en outre des soins à autre un peu de bouillon, et de la pte à l'annonciation, quelque temps après
ayant été malade à l'hôpital pour y voir un soldat qui venait de recevoir un
coup de sabre qui lui avait coupé presque tout les Membre de la partie postérieure du bras,
je passai la nuit, et me couchai auprès d'elle, qui environ deux heures après la perte
n'avait pas reparu, la malade avait recouvré de la chaleur, et se pouvaient quelque temps
à l'air beaucoup allégée. Sans cet état j'attendais patiemment les efforts de la nature, environ
cinq à six heures après, les douleurs s'étant rapprochées, et étant devenues assez vives, la
malade éprouvant d'ailleurs un embarras douloureux vers l'anus, je me décidai à faire
l'ablation d'utampou, et de quelques caillots de sang qui la suivirent. ayant lors
trouvé l'orifice dilaté de la grande ouverture imputée et très mince et très souple, réfléchissant
aussi que les douleurs étoient assez énergiques et rapprochées, je n'hésitai pas d'ouvrir
les Membranes qui commençaient à s'étendre, et je commençai ensuite à la nature
l'expulsion de la tête du fœtus qui se présentait favorablement, peu à peu les
douleurs revinrent très vives, et quatre heures après l'accouchement fut terminé
très heureusement pour la mère et pour l'enfant.

à cette observation, nous pourrions en joindre plusieurs autres, pour prouver
l'usage d'utampou dans les cas qui nous occupent, et lorsque l'orifice utérin est étroit
épris, et plus ou moins dilaté. Mais lorsqu'on a une cette dilatation déjà avancée,
soit avant, ou après l'usage d'utampou, après avoir ouvert les Membranes, afin de
favoriser le développement parfait de la matrice, convient-il toujours de recourir à la nature
et de l'abandonner, lorsqu'une fois que l'hémorragie est arrêtée, quela tête du fœtus
est sortie? La nature se charge de tout, et que le bassin à une étendue, et de la
dimensions convenables! pour se décider à ce parti, il faut que les contractions utérines
soient assez vives et assez rapprochées, quela femme conserve assez de forces, et que
les bords de l'orifice soient assez souples, et prêtent assez facilement pour espérer que
l'accouchement se terminera en peu de temps; en effet, l'arrivait quela femme se
trouvait beaucoup affaiblie, ou qu'elle fut naturellement faible et enervée, si les
douleurs étoient éloignées les unes des autres, et quela Matrice manquait d'énergie,

12 Si certain des bords de l'orifice étoient tenus assez épais pour faire juger que la
 dilatation suffisante se fera difficilement, il est à craindre alors que l'aide ou l'aide-
 tant trop long temps à se faire, la femme perde de plus en plus de ses forces.
 ou quelle ne soit pas capable de soutenir ensuite les évacuations qui suivent
 la délivrance; ou qu'enfin le fœtus s'étranglant par des sueurs nécessaires, ou ^{et même} ~~par~~
 trop long temps comprimé dans la Matrice, ne perde aussi la vie; pour éviter ces dangers,
 il est nécessaire dans cette circonstance de ne pas avoir dans la matrice plus de
 confiance que la nature ne peut en permettre, et c'est ici le cas ainsi que
 d'interdire aux accoucheurs de recourir à la lenteur de l'accouchement Naturel en
 empruntant quelque chose de l'accouchement Forcé, aussi nous paraît-il pré-
 -nable alors non seulement de soutenir les forces de la Malade avec les ^{ou fortats} ~~ou fortats~~
 nécessaires, mais encore de recueillir et d'exciter l'action de la Matrice par un peu
 des élévations légères & violentes que par des dilatations ménagées interrompues
 par des instants de repos, et toujours proportionnées au degré de résistance
 de l'orifice. par ce moyen ~~dit moyen~~, on parvient à soutenir et à augmenter
 les efforts à ranimer le travail des Malades et on met ainsi la nature sur
 la voie de terminer seule l'opération qui lui est due. Ce parti d'ailleurs
 ainsi que l'observe judicieusement le même auteur, fournit encore un avantage
 c'est que si la mauvaise situation de l'enfant, ou des accouchements trop pressés
 exigent d'accourir le tems qu'il faut donner au travail de l'opération Naturelle
 ce qu'on a fait pour y parvenir sert de préparation, et dispose l'orifice à se
 prêter à une dilatation plus violente et plus prompte, et à rendre l'accouchement
 d'autant moins douloureux.

penant qu'on n'ait par infirmité de quelque nature d'organe, que je conseille de tenir
 les femmes en aucune manière, et par des sauteries et des efforts inconsiderés, circonvenant
 dans les cas qui nous occupent, des frictions légères sur le ventre, et des agitations ménagées
 de l'orifice de la matrice, mon but est simplement de mettre en jeu les puissances fonctionnelles
 qui aident et fortifient l'action de la matrice, et d'exciter celle-ci, lorsque elle
 est engourdie et insuffisante, afin d'éviter ~~ou de prévenir~~ une lenteur du travail de
 l'enfant, enant qu'il plus souvent est alors, nuisible à la mère et surtout à l'enfant
 ainsi que le prouvent mille observations, parmi les quelles nous citerons les suivantes.

En 1771. ou 1772. M^r. Rion, professeur d'accouchements à Rennes, fut appelé
 auprès d'une Lxx. qui éprouvait depuis quelques heures une perte an-

considérable pour lui avoir causé une ébriété. Le professeur ayant trouvé l'orifice de la matrice dilaté & la largeur d'un ou de 3^e perça aussitôt les membranes. La porte s'était ~~arrêlée~~ arrêtée après l'évacuation des eaux, et trouvant que la tête du fœtus se présentait favorablement dans un bassin d'ailleurs bien conformé, crut devoir abandonner l'aide à la nature. Cependant voyant que les douleurs étaient toujours faibles, et ne revenaient qu'à très longs intervalles, il crut que les forces de la nature ne seraient pas suffisantes, et proposa de terminer l'accouchement et demanda en conséquence une consultation. M^r de l'Université très habile accoucheur celui voyant le travail ainsi disposé, espère qu'en donnant de temps à autre à la malade quelques confortatifs, la nature recouvrera de l'énergie, et que l'accouchement se terminera dans les secours de l'art. Le raisonnement justifié & reprognostiqué, mais l'enfant vint mort, après vingt heures d'un travail ennuyeux et pénible et la mère était si faible, qu'elle fut près de trois mois sans recouvrer la santé.

Mauriceau (A) nous présente un fait semblable. appelée auprès d'une femme qui fut prise pendant les douleurs de l'enfantement d'une perte considérable, il jeta promptement les membranes. voyant que la porte s'était arrêtée après l'évacuation des eaux, et trouvant alors que la tête et le bassin étaient favorablement disposés, il espère que la femme conservera assez de forces pour faire valoir les faibles douleurs qui existaient, et confia en conséquence à la nature l'expulsion de l'enfant. elle se fit après un laps de temps un peu considérable, mais l'enfant vint mort, et la mère fut beaucoup plus à se rétablir.

Dans la même circonstance un événement plus malheureux vient arriver. se fut appelée en 1781. par un sage-femme de cette ville auprès d'une femme qu'elle assistait et qui avait eu ^{après vingt heures d'un très pénible travail} ~~une perte considérable~~ une perte assez abondante qui s'était arrêtée depuis une demi-heure après l'évacuation naturelle des eaux. comme cette femme était d'instinctivement naturellement forte et vigoureuse, jammeson poids quoique fréquent, n'était pas affaibli, buvant de l'eau originaire utérine avec souplesse et dilaté après l'un ou l'autre livres, et la tête du fœtus qui se présentait dans une position favorable, je me bornai à conseiller à la malade quelques sucs, et j'eus l'intention de prendre d'heure en heure un peu de bouillon, et de temps à autre un peu d'apocynum deiris, et une cuillerée d'inspersion faite avec infusion de tilleul, d'eau de fleur d'orange, de sirop de réglisse et 20 à 30 gouttes de liqueur anodine de Sydenham. cinq à six heures après les rappelés. trouvant que la malade n'avait point perdu des forces, et même en

(A) obs. de xxiv tom. 2. pag. 312.

avait rompu, m'étant assuré d'ailleurs que l'orifice était très dilaté et prêt à dépasser l'épaisseur de la tête dont l'écoulement commençait à s'approcher de l'anus. Des pulsions, et quelques douleurs qui s'étaient rapprochées, étaient vivaces, je me déterminai à conseiller d'attendre encore les efforts de la Nature, espérant qu'ils seroient victorieux. Ils le furent effectivement environ trois heures après, mais l'enfant vint mort et la mère n'y survécut que six heures, quoique l'abstraction d'après la mort fut presque naturellement et sans avoir aucun suite d'hémorragie, ainsi que j'en ai bien de l'assurance ayant été revu cette nouvelle un quart d'heure avant qu'elle expirât.

D'après ces faits, nous sommes portés à conseiller l'aide de l'opération Naturelle de l'accouchement, ainsi que nous l'avons exposé précédemment, et même de l'abandonner par art, toutes les fois que la faiblesse de la femme, et le peu d'énergie des contractions utérines feront appréhender quel accouchement se fera trop tardivement, et surtout lorsque la tête du fœtus, ou le bassin ~~Marguerite~~ ne jouiront pas des proportions les plus favorables. Si l'on eût pris ce parti dans les cas que nous venons de citer, il est probable que dans les deux premiers l'enfant eût pu faire la vie, à l'enfant, et que dans le troisième, si j'avais eu moins de confiance dans les forces physiques de cette femme, j'en eusse conservé la vie ainsi qu'à l'enfant, comme j'y ai réussi dans les cas suivants.

En 1783 je fus appelé auprès de M^{lle}... d'une très faible complexion, et naturellement sujette à l'asthme. étant dans les douleurs d'enfantement, après différentes crises de toux, il lui survint une perte. Je fus mandé aussitôt comme la malade souffrait depuis quatre à cinq heures, j'examinai aussitôt l'état de l'accouchement. ayant trouvé l'orifice assez souple et dilaté de plus de la largeur d'un ou deux livres, et qu'il se coulait toujours un peu de sang, je ne balançai pas à ouvrir les membranes. comme la tête de l'enfant se présentait ~~comme d'habitude~~ l'hémorragie s'arrêta aussitôt après l'évacuation des eaux, et que le pouls de la malade annonçait assez de forces, je me bornai à lui conseiller le repos au lit, d'une manière reposante à laquelle j'y fis la tête et la poitrine assez élevée pour que la respiration fut moins gênée. et je prescrivis par intervalles, un peu de bouillon, l'acide sulfurique unie à une cuillerée d'un looch fait avec l'infusion de lierre terrestre; le

Sirop de quinquina, quelques grains de gomme adragant, et une demi once
 de sirop d'opium, peu à peu la toux se calma, mais quatre heures s'étant écoulées
 sans que les douleurs utérines eussent varié qu'à de très longs intervalles, et remarquant
 qu'elles étoient très faibles, et de très peu de durée, j'essayai à les exciter par de légers
 frictions sur le ventre, et de temps à autre, j'écartais avec les doigts et avec le plus
 de relâchement possible, l'orifice de la matrice, par ces moyens, les douleurs se
 rappochoient, et devenaient ensuite successivement plus énergiques. La malade
 se ranima alors, et les fit valoir avec un tel courage, qu'en moins de trois heures
 l'émouvement fut terminé très heureusement pour elle et bien fort constant.

Outre-fait et plus difficile d'opérer l'illumination de la matrice, et les forces sont
 tellement diminuées, qu'il est plus qu'incertain si elle pourra aux efforts qu'elle
 nous présente sans l'application du forceps, ou l'extraction à l'aide du forceps
 comme nous l'avons fait dans les cas suivants.

6^e le 1787. nous sommes appelés à la Hôte au Châteauneuf x. c'est-à-dire à
 demeure de trois lieues, pour y voir M^{lle} qui cuse mettant le troisième ailette se sentit prise
 d'une fièvre à huit mois et demi de grossesse. lorsque les eaux étoient écoulées
 depuis une heure, et la fièvre qui avoit été considérable étoit venue. l'orifice de la matrice
 étoit dilaté de environ au coudé trois livres. ses bords étoient ~~enfoncés~~ ^{enfoncés} mais avec souplesse,
 les douleurs étoient faibles, très éloignées les uns des autres, et n'avoient aucun effet notable
 de la fièvre qui se présentait. la malade d'une constitution naturellement vaporeuse
 et délicate souffrait depuis huit heures, et se plaignoit d'un froid extrême aux extrémités
 comme elle n'étoit pas très affoiblie, j'entreprendrai d'abord à rappeler l'acétalheur, en passant
 le lit de langes très secs, et en appliquant aux extrémités des bouteilles remplies d'eau chaude.
 je ~~me~~ ^{me} pris ensuite à la malade par intervalles, quelques cuillerées de bouillon
 dans lequel je fis ajouter un peu de vin rouge, peu après l'acétalheur revint et le pouls
 quoique ~~faible~~ ^{faible} commença à s'élever & s'avantager. comme les douleurs utérines étoient
 toujours faibles et très éloignées les uns des autres, j'essayai alors à les exciter en
 frisant avec la main quelques légers frictions sur le ventre et en écartant par
 degrés les bords de l'orifice. quatre heures s'étant écoulées sans qu'aucun des moyens de
 nous entraînassent les douleurs, remarquant d'ailleurs que l'orifice n'étoit assez étendu

je crus, si la mauvaise constitution de cette Dame ne devoit pas attendre plus
long temps ces efforts de la nature, et je n'hésitai point à soullever la tête du
fœtus. et conséquemment j'opérai peu à peu dans la matrice, ou j'aidai les Picots
de l'enfant, à l'aide des quels j'éterminai graduellement son extraction: il étoit
envie et enjoinit encore actuellement, mais la mère seya affoiblie, & eût
les premiers jours de la couche dans des anes considérables d'opacow, et ne
arriva à la rétablie qu'au moyen des invraisemblables du quinquina, & du lait
de chèvre.

Mais il arrivait que Malgré l'écoulement de sang, & l'hémorragie continuas
l'aidait-il lorsque l'infirmité est très pénible, et lorsque les bras sont si rigides qu'on
ne peut se promettre de les écarter qu'en employant des efforts répétés et considérables,
l'aidait-il dis-je, recourir au bistouri à l'incision de l'utérus? si l'on ~~considérerait~~
seulement, que ce moyen peut mettre fin à l'hémorragie et ~~considérerait~~
~~la mère, et à l'enfant,~~ il est certain qu'on se hâteroit toujours de l'employer.
mais ~~est-il toujours praticable?~~ et n'a-t-on rien à craindre des efforts
qu'on seroit obligé d'employer, sous dilato l'infirmité suffisamment pour permettre à la
main de pénétrer dans la matrice et aller y chercher les Picots de l'enfant? la
question de cette difficulté nous l'aient donnée dans l'ouvrage de M. le Docteur: A) ~~ce~~

- 11 Ces différentes Manœuvres dit cet auteur, ne peuvent elles pas déterminer l'infirmité utérine
11 ou contondre et le disposer à l'inflammation: pendant qu'on les pratique. La pondeuse
11 peut elle pas augmenter au point de faire craindre pour les jours de la malade,
11 avant ou immédiatement après l'opération? (B) ces inconvénients palpables aux
11 quels la méthode de puzos ne remédie qu'imparfaitement; et quelle pratique, en
11 tout desirer avec raison une plus douce et plus analogue à la nature elle ne nous offre
11 proposer, nous paraît avoir ces caractères, et est toujours sûre et productive d'un bon
11 résultat. son moyen ou l'empêcher le sang des écoules au dehors, ou favoriser la formation
11 d'un caillot continu depuis l'infirmité, jusqu'au lieu où le délivre est décollé, et qui fournira
11 lui même la source qui le fournira, par cette raison on ménagera les forces de la nature,
11 ou lui fournira le secours de les rétablir, et d'agir avec ~~une certaine~~ énergie. et de l'involution
11 et en même temps l'énergie dont elle est capable. (C) ~~ce~~

(A) Les pertes utérines Par. 291. Page 215.

(B) Le dernier accident a été remarqué par lui-même, il rapporte qu'un J. Germain son confrère, occupé
à essayer sa méthode et à faire naître le donneur de nouveau. chez une femme grosse de huit mois fut
soudainement effrayé par l'abondance du hémorragie qui se renouvelloit pendant qu'il étoit l'infirmité qui
résulta, qu'il n'hésita pas à faire les plus grands efforts pour terminer l'accouchement.

à l'hyperémie du col utérin, Mr le Docteur de l'Observation suivante (A) il parle d'une femme qui éprouvait depuis plusieurs jours, une perte assez considérable. trouvant les eaux coulées, l'orifice dilaté & de largeur d'une ponce & vingt quatre sols, et l'écoulement du sang qui se ressentait favorablement, il expose quelle nature sera triomphante; & voyant la perte diminuer, il le soutient de recommander le repos. L'hémorragie s'étant renouvelée quelques heures après, et les douleurs du travail étant incessamment, il crut devoir venir au secours de la nature, et essaya en conséquence l'auouchement forcé. mais ne pouvant réussir à dilater suffisamment l'orifice, à cause de sa solidité et de son épaisseur, il ne vit dans cette perplexité d'autre parti à prendre que de se servir d'un tampon. il réussit, l'hémorragie s'arrêta, les forces revinrent, les douleurs se firent veiller, et l'auouchement s'accomplit heureusement cinq à six heures après.

Le même auteur (B) parle encore d'une femme au neuvième mois de grossesse, qui essuyait une perte considérable, quoique les eaux fussent écoulées depuis long temps. l'orifice de la Matrice était dilaté de la largeur d'un œuf de trois livres, et les douleurs étaient très faibles; reconstruit à l'orifice l'état de l'enfant; il était avec difficulté, et espère par ce moyen d'extraire l'enfant jusqu'aux fesses. mais la résistance qu'il éprouva, et l'augmentation de la perte le décidèrent à aller chercher l'autre pied. quelque adresse, et quelques efforts qu'il employa, il ne put réussir. L'orifice, dit-il, serrait mes doigts exactement, il était mince et si tranchant que j'aurais cru desirer très aisément si j'avais voulu le forcer. pour éviter cet inconvénient, il prend le parti de temporiser, et de laisser les doigts dans l'orifice, afin de faire l'office d'un tampon, d'opposer ainsi un obstacle à l'hémorragie, et d'empêcher les contractions utérines. cet expédient lui réussit; mais il fut obligé de rester dans cette position fatigante plus d'une demi-heure avant de parvenir à terminer l'auouchement.

Si l'on consulte les auteurs, on trouve plusieurs exemples de cette rigidité de l'orifice dans le cas qui nous occupe. souvent elle a été telle qu'après de vains efforts pour dilater, l'on a été obligé d'abandonner les malades, ou l'on n'a pu y parvenir sans le déchirer. La Motte (C) parle d'une femme qui avait été prise d'une perte à la suite d'une chute de Cheval: au instant que les eaux furent écoulées, il s'aperçut que le col de l'enfant se présentait. trouvant que l'orifice de la matrice était dilaté de manière à y introduire aisément les doigts, il se mit en devoir de terminer l'auouchement, & y réussit ainsi: « Pour cet effet, j'eus la malade en situation j'introduisis un, deux, et jusqu'à quatre fois mes doigts, mais il me fut impossible d'y joindre le ponce; puis j'eus cette douleur aux mains, afin d'aller chercher les pieds de l'enfant, qui était l'unique

(A) obs. xcii. Page 219.

(B) obs. cxi. Page 152.

(C) obs. ccm. Page 354.



11 mappin terminée et au couchant. j'en ai tout en usage sous en venir à
11 tout malgré le précepte de Mr. Bell, qui dit de se bien garder de faire violence à
11 la Matrice en pareille occasion. j'en ai au contraire tiré toute celle que je pus faire,
11 j'en tirai plus de dix fois en différents temps, j'y introduisis de l'huile et de la
11 maise autant que je pus, sous d'aillieu la relaxation de cet orifice, que je
11 trouvais fermé et si fermée, que je ne pouvais comprendre, comment une partie
11 Membraneuse dont le propre est de se dilater, pouvait apporter un si grand
11 obstacle à mon dessein. Ces de telles difficultés firent enfin cesser cet
11 accouchement à l'issue de Malade au pres pendant toute la nuit jusqu'à six
11 heures du matin, on revint au pres d'huile, et trouvant alors l'orifice suffisamment
11 dilaté, il termina aussitôt l'accouchement.

11 en pareille occasion, le même auteur éprouva le même sort. appelé
11 au secours d'une femme prise d'une porte avec abondance, et ayant reconnu
11 quelles bras de l'enfant se prenoient, il va chercher les pieds qu'il saisit, sans
11 pouvoir les attirer hors l'orifice, ainsi qu'il le dit (A) Mais pour faire sortir
11 les pieds avec ma main, il était impossible tant l'orifice de la matrice se trouvait
11 dur et inflexible à mon dessein. j'en trouvais pas de difficulté d'attirer
11 ma main seule ni à l'intérieur. mais aussitôt que j'y joignais un des
11 pieds pour peu que ce petit corps gonfle le volume de ma main, il était impossible
11 de le retirer, tant cet orifice intérieur était peu capable de dilatation je fus
11 obligé de laisser les pieds au bord de cet orifice comme callous, aux quels je
11 fis passer deux fois, un à chaque pied, après quoi j'en tirais un de hors qui
11 venait tout à l'aise, mais sans pouvoir attirer le second. je les tirai ensuite
11 tous deux ensemble. après avoir fait rentrer celui qui était sorti, j'y eus
11 le peu de succès, que je fus forcé d'abandonner l'ouvrage. Il abandonna
11 effectivement, et après avoir passé beaucoup de temps à employer des huiles
11 et des graisses, et à chercher des plantes émollientes, à la vapeur de la
11 quelles il se disposait d'exposer les parties malades, il examina enfin si par
11 la manœuvre il n'y avait point occasionné quelque inflammation, et trouvant que
11 l'orifice s'était beaucoup relâché, il termina alors l'accouchement sans la
11 difficulté.

L'usage de l'aiter, qui peut avoir des effets. L'expérience qu'on a eue quelque fois
de l'usage de la matrice: quel danger ne pourroit-il pas remettre des efforts multipliés de la Matrice,
si l'on n'avait pas enfin laissé les malades en repos, et si la peste dont elles étoient atteintes
ne s'étoit pas arrêtée, ainsi que l'indique et avoue même à l'extrême ses observations;
N'est-il pas beaucoup mieux fait de suivre le conseil de M. Lén, qu'il semblerait
repris, Mouroit-il pas dû s'abstenir d'irriter violemment l'organe utérin, et
conseiller à ces malades le repos et le leur procurer, ainsi que le pratiquait Melle.
à l'aide des calmants et des opiacés: ces secours n'étaient-ils pas plus convenables,
quel usage si ordinaire et si abusif, de ces huiles et de ces graisses, qui se nuisant
par la chaleur, deviennent toujours aires et irritantes, et sont ainsi plus propres
à augmenter l'inflammation, la tension et la sécheresse, qu'à procurer le relâchement
désirable. D'ailleurs l'emploi de ces substances, si peu propres à dissoudre, et à appaiser
souvent l'écoulement à la muqueuse naturelle. Tout le vagin et l'organe se trouvent
naturellement lubrifiés, et d'autant plus inutile et dangereux, que les vaisseaux
dans ces parties un peu de cette humeur muqueuse. que la nature y dépose pour les
relâcher, en en couvre la plus grande partie, toutes les fois que l'on y porte suffi-
samment les doigts, et l'on s'oppose ainsi à une réparation avantageuse
dont on ne peut avoir les bons effets que par des injections mucilagineuses; quelques-uns
même la matrice ont été retirés de ces bains de vapeur qu'ils s'étoient employés.
La rarefaction qui en est la suite, n'était-elle pas propre à renouveler l'hémorragie,
et ne s'étoit-elle pas le plus souvent augmentée l'enflurement et la tension, et prévenue
ainsi tout l'opposé de ce qu'on se propose. aussi dans les cas ordinaires on en fait si
souvent usage, qu'on n'a pas toujours l'effet qu'on en attend, et ils ne deviennent ni
avantageux qu'autant qu'on les dirige, et qu'on les fait atteindre l'organe qu'on
desire relâcher, et surtout qu'autant qu'on a auparavant par la saignée et les
débruyants, diminué suffisamment la pléthore, pour qu'on n'ait plus rien à craindre
de ses effets.

quoiqu'il en soit, lorsque l'organe de la matrice se trouve aminci, et qu'on
ne le voit pas à quatre doigts et plus, il n'est pas rare que son col soit encore
si peu développé, ou qu'elle soit telle que l'organe interne soit constitué de fibres

si fièbres et si rigides, qu'on ne peut souvent réussir à introduire en entier.
La main sans l'ancien déchirement, amoins d'un royer ou violence capable
de faire un déchirement. et au-delà est arrivé à laquelle même parvins de
perte qui nous occupa. en effet cet auteur parle d'une femme qui souffrait
d'une hémorragie si considérable, qu'elle l'a mit réduite à un état effrayant de
foiblesse. l'orifice était dilaté d'une demi-couronne, et les pieds et les fesses
de l'enfant se présentaient. Malgré cette dilatation déjà avancée, et l'état
d'atonie et de relâchement qu'on pouvait espérer dans cette circonstance
Mellie dit (A) il me fallut beaucoup de force pour dilater l'orifice
de la matrice. et en introduisant ma main, je sentis quelle avait, et
se déchirait du côté gauche. c'est-à-dire, ajoute-t-il, m'instruisa,
parce que j'avais par-devers moi une observation d'une femme qui n'était
pas si foible, et par les grands efforts qu'on fit pour sauver l'enfant et
l'enfant, l'orifice de l'utérus avait été déchiré, et la femme mourut au bout
après. &c.

Le même auteur (B) parle d'une autre femme, qu'on avait tenté
d'accoucher de force, parce que l'enfant se trouvait dans une mauvaise
situation, et qu'il était survenu une perle. après plusieurs tentatives
inutiles de plusieurs accoucheurs, pour dilater l'orifice qui était déjà assez
ouvert pour y introduire les doigts, après avoir même essayé inutilement
l'usage du crochet à deux reprises différentes, Mellie se trouva forcé
d'abandonner cette malheureuse femme, qui perit quelques jours après à
la suite d'une convulsion qui lui survint.

ce Malheur inopiné, ajoute Mellie à la fin de cette observation,
me fit réfléchir, que comme d'hémorragie n'était pas forte, et que la
malade d'abord n'était pas foible, il aurait été peut-être mieux d'attendre
plus long-temps, et laisser agir la nature avant qu'on vienne les parties.
Cette observation, continue-t-il, doit apprendre à tous les praticiens
d'attendre quelque temps la nature, et de ne point employer trop de violence pour
dilater l'orifice de la matrice, lorsque la Malade n'est point dans un danger absolu.

(A) Mellie obs. II. tom 4. page 143.

(B) obs. VIII. tom 4. page 314.

Plus d'après le conseil que j'en suis venu à composer pour le cas suivant. 74
Le 17^e j'ai mis moules à boues, dans l'oreille s' y j'ai mis un
coulange, qui après avoir essayé une partie de la nuit de ces souffles douloureux, fut prise
tout à coup le lendemain matin plus promptement avec abondance, ayant été appelée
sur le champ, et ayant brouillé l'orifice de la matrice de l'écate de la largeur d'une pièce
de vingt quatre sols, j'ai pu aussitôt les membranes ayant le sein de laifscouet
doigts dans l'orifice, tant pour empêcher les eaux de s'écouler tout à coup, et de
favoriser ainsi la contraction générale de la matrice, que pour me permettre de
laisser plus facilement les pieds de l'enfant qui présentait le côté. j'en suis venu
à introduire successivement la main dans l'orifice, mais les lésions étaient si
dans l'oreille, que j'en suis venu à introduire que quatre doigts ~~lors~~ ^{lors} de la
réunis en forme d'écluse, avec les quels je parvins cependant à accrocher un pied,
que j'en suis venu à attirer hors l'orifice. car chaque fois que j'en retirais les doigts
le pied m'échappait, sans pouvoir le saisir plus haut et plus fortement. après
avoir tenté inutilement l'extraction pendant près d'un quart d'heure, et voyant que
la perte était arrêtée, j'en suis venu à laisser cette femme en repos, ainsi qu'elle
avait été, mais n'ayant rien à gagner, et voyant comme elle n'était point affaiblie, qu'elle avait
au contraire le ventre assez plein et assez élevé, j'en suis venu à la saigner du bras,
et j'en suis venu à prendre ensuite un lavement emollient, et deux gros de sirop de réglisse
étendus dans un demi verre d'infusion de tilleul. à l'aide de ces secours, la malade fut
assez tranquille à quelques légères douleurs près qui étaient très éloignées, et n'ayant
quedans l'attente d'une dilatation plus considérable de l'orifice, j'en suis venu
expectant pendant plus de quatre heures, au bout desquelles, les douleurs étant
approchées et étant devenues assez vives, je touchai la malade avec la seconde
doigt. ayant remarqué alors que ^{les bords de} l'orifice étaient beaucoup plus souples, et ouverts
de la largeur de plus d'un pouce de six lignes, et qu'un pied de l'enfant s'y présentait,
je le saisis et l'attirai successivement jusqu'à l'écate. les autres deux doigts
le long de la cavité interne, j'en suis venu à en beaucoup de difficulté à faire l'autre
pied que j'en suis venu à rapprocher, et de concert avec les contractions utérines qui
se faisaient sentir, j'en suis venu à l'écate. l'accouchement, qui fut très

heureux pour la mère et pour l'enfant.

Mais si dans l'écoulement d'origine de l'écoulement, la perte
est continuée après l'évacuation des eaux, quelle conduite est-il fallu
tenir? nous pensons que c'est celle qu'a tenue M^r Leroux dans les observations
que nous avons précédemment citées, et celle que nous avons suivie dans
celles ci après.

Le 11 1783. nous fumes appelés auprès d'une femme de cette ville, d'origine
de fort bonne, et qui depuis quelques heures, éprouvait une perte peu considérable
mais assez continuée pour causer de l'inquiétude. La sage femme qui
l'assistait étoit ordinaire dans toutes les couches, mais avoit rompu les
membranes dès le commencement du travail par laquelle avoit trouvé l'écoulement
dilaté de la largeur d'un petit œuf. elle m'ajouta qu'elle avoit cherché à
le reprendre, mais la contraction ~~de la matrice~~ ^{de la matrice} a retourné la tête, mais
qu'elle n'avoit pu y réussir, ne pouvant introduire sa main dans la matrice.
arrivé auprès de la malade. d'une assez bonne constitution, j'en trouvais
le pouls fébrile, mais plus grand que petit. j'abordai d'abord à calmer
son inquiétude, et lui demandai ensuite si m'affaires de son état. l'ayant
donc touchée, je trouvais l'écoulement situé fort en arrière dans la cavité de l'utérus,
et dilaté de la largeur d'un peu plus d'un œuf et trois lignes. il me parut
d'abord assez souple, mais ses bords étoient très élevés, assez épais, et si
sensibles au toucher, qu'ayant cherché le plus doucement possible à le dilater
avec un de mes doigts qui font trois quarts, j'en eus peine à en faire un autre.
sans arriver à la matrice. les uns les plus pointus, et les premiers les plus
durs pour la laisser tranquille, comme il s'étoit toujours de la
matrice un écoulement de sang et sanguinolent, j'en eus peine à le lever le plus
que j'eus la tête du fœtus, afin d'y parvenir un resserrement plus parfait
de la matrice, en procurant l'évacuation complète des eaux, dont
il ne sortit qu'une très petite quantité avec un léger caillot de sang.
renvoyant au état d'insensibilité et d'origine de l'écoulement, nous pûmes
attendre sans risque une plus ample évacuation, et parvenue en cet état

la continuation de l'hémorragie, j'appliquai aussitôt à l'ouverture de l'orifice
quelques bords de l'éponge imbibée de vin et de vinaigre, que j'y tins avec une
éponge imprégnée de la même liqueur, que j'introduisais dans le vagin. après cette
application je fis prendre à la malade un verre d'infusion de tilleul, dans lequel
j'ajoutai une demi once de sirop d'opium. L'hémorragie ne reparut plus; une
heure après le saignement eut son effet, et la malade s'endormit. son saignement
cependant était interrompu de temps à autre, par des douleurs qui se faisoient
sentir dans les reins et vers l'anus. au bout de dix heures, elles s'augmentèrent
vives, et se firent si douloureuses rapprochées que je crus devoir faire l'extraction du
tampon qui fut suivi de quelques caillots de sang. ayant alors touché la
malade, je trouvai l'orifice irrité de la largeur d'un verre ordinaire, ses bords
étaient serrés mais encore fort tendus et serrés sur la tête du doigt qui
commençait à s'y engager. comme il n'apparoissoit plus aucun écoulement
quel que la malade n'était point fatiguée, et même avait recouvré des forces, j'espérai
que les douleurs et vives seroient suffrantes, et j'abandonnai en conséquence à la
nature le soin d'entraîner, ayant seulement l'attention de soutenir les forces
de la femme avec quelques sorbes de bouillon. mon attente fut satisfaite, et
au bout de cinq heures l'accouchement fut heureusement terminé. Pour
la mère et pour l'enfant qui à la vérité fut d'abord très faible, mais
se remit assez promptement après quelques jours d'allaitement.

quoique ces exemples aient été le passage du tampon, toutes les fois que
la perte utérine continue après l'évacuation des caux, et lorsqu'en même temps
l'orifice de la matrice présente une rigidité pour permettre sans une violence
dangereuse l'accouchement. On ne doit observer qu'il faut encore avoir
l'attention de faire garder à la malade le repos le plus parfait au lit, et de
ne la tourmenter en aucune manière. Il est encore très utile de lui faire
prendre ainsi que l'exigeait sa santé, des calmants et des fébrifuges.

24 afflu en fontaine des étiens, et trié avec à la nature le choquement et le post.
nécessaires pour les reparer. il n'est pas moins prudent dans ceux où l'on
abandonne l'accouchement à la nature, de consulter souvent les étiens de la
femme. en effet quoique l'hémorragie ne paroisse plus au dehors, après
l'évacuation des eaux, ou après l'usage du tampon, il peut arriver que
le sang empêché de sortir extérieurement soit par la compression du fœtus en
passant sur l'orifice, soit par celle du tampon qui y est ~~appliquée~~ ^{appliquée}, il peut arriver
disje que le sang s'épanche dans l'intérieur de la Matrice, et s'y accumule
de proche en proche au point d'occasionner des fièvres capables d'entraîner
la mort de la mère et de l'enfant. Voici à cet égard un fait dont
j'ai été témoin.

en 1772. M^{re} Jean Sage femme jurée à Rennes, me fit
appeler auprès d'une personne qui lui avait été confiée, et qui à 7 mois de
grossesse, après quelques légers douleurs fut prise d'une pente assez considérable
pour engager cette sage femme, à s'assurer de l'état de l'accouchement.
ayant trouvé l'orifice utérin dilaté de la largeur d'environ un œuf de trois
lignes, elle s'était empressée de percer les membranes, après quoi l'hémorragie
s'étant aussitôt arrêtée et la tête du fœtus se présentant, elle en avait abandonné
l'expulsion à la nature. mais voyant que la malade s'affaiblisait, et
que deux heures s'étaient écoulées sans que les douleurs utérines se fussent
fortir, je fus mandée auprès de cette femme. Son pouls était à peine sensible
et elle avait les extrémités froides, et la parole presque éteinte. Dans cet état
je portai aussitôt les doigts dans le vagin, et sans y trouver qu'un léger caillot
de sang, je remarquai que la tête du fœtus était exactement bouchée par
l'orifice assez aminci, et dilaté de plus en diamètre d'un œuf de six lignes.
n'étant mis en devoir de soulever la tête du fœtus pour tâcher d'en tirer
dans la matrice, il en sortit aussitôt une si grande quantité de sang que
j'en fus effrayé, et que jeune praticien encore, je balançai à continuer
d'entreprendre l'accouchement, dans la crainte que cette femme ne fût morte.

pendant l'opération, néanmoins encouragé par la crainte d'une femme qui n'aurait
souvent l'occasion d'anistér, ~~les femmes en~~ ^{forment, dans leurs accouchements,} et trouvant qu'il n'y avait
longue de la matrice, ce qui était assez étroitement; je continuai de faire comprimer le
ventre de la malade, et je pénétrai peu à peu dans la matrice, ou parmis plusieurs
guirlandes de sang, j'étais les piliers de l'enfant, dont je fis successivement
l'extraction. Il était mort, et la mère était tellement affaiblie après la délivrance
que je fus obligé d'appuyer par la continuation de la perte après la sortie de l'enfant, qu'elle
donna plus d'une fois pendant sa couchée des inquiétudes sur sa vie, et qu'elle fut
près d'un an à se rétablir parfaitement.

Quelque nous n'ayons trouvé dans la pratique que ce seul exemple d'un pareil
panchement, n'a-t-on pas lieu d'en craindre qu'il puisse être quelquefois produit
par l'usage d'un tampon, ou par l'arrêt ~~de~~ l'enlèvement de la tête dans le bassin,
surtout lorsque le corps de la matrice serait tombé dans l'inertie, et serait ainsi
disposé à prêter à l'accumulation du sang. Pour éviter cet danger, n'est-il pas
convenable d'examiner souvent dans ces cas, si le corps de la matrice reprend
point de l'extension, et même ne pourrait-on point s'y opposer, en le
comprimant suffisamment au moyen d'un bandage à corps. Pour tenir les
parois au degré de resserrement qu'ils auraient acquis après l'évacuation des
caux, au reste, lorsque dans le cas qui nous occupe, on abandonne l'aiguille enrou-
lée dans la matrice, quoique l'hémorragie ne reparaisse pas, il est nécessaire,
nous le répétons, de consulter souvent les forces de la malade, car si l'on
s'aperçoit qu'elles diminuent sans que le travail avance, on doit s'arrêter à
détourner, trop de sécurité alors serait irréfléchie, et pourrait devenir
funeste à la mère et à l'enfant, et il est urgent alors de terminer
l'accouchement soit en retirant l'enfant, soit en faisant usage
du forceps ou d'un autre, selon que l'avance de la tête dans le bassin, ou toute
autre position, détermineront de préférence l'un ou l'autre des moyens.

Après ces différentes considérations, nous pouvons qu'il est facile



figures, quelles sont les circonstances, où dans le cas de perte intérieure excusée par
ce déversement d'inspiration Duplacuta dans l'intérieur de la Matrice, l'empêchement avec
confiance, après les secours nécessaires, abandonner l'avouchement à la nature; et quelles cir-
constances, où il est urgent d'empêcher aussitôt à l'art. mais lorsqu'on est forcé à prendre la
dernière parti, soit par la débilité de la femme, soit par la mauvaise situation de
l'enfant. Soit par la violence des hémorragies, il est certainement des précautions nécessaires
et essentielles à garder, sans les quelles on expose les femmes à des dangers aussi
graves, que si on les avait abandonnées aux soins seuls de la nature. nous voulons
parler de la lenteur combinée avec la quelle l'on doit alors procéder à l'avouchement,
après s'être déterminé graduellement la contraction de la matrice, et prévenir ainsi
son inertie consuevie, à la perte d'oxygène qui en est la suite. c'est surtout
à point de pratique que nous nous adressons à l'élève en cherchant à exposer sous la
méthode la contraction graduelle de la matrice. mais pour obtenir l'avantage
de cette précaution, il faut avoir fait de la façon les deux choses que nous
disons, ce qu'on a obtenu, en laissant comme melle l'a fait dans plusieurs
circonstances, jamais oufer doigts dans l'office de la matrice, parce qu'en faisant
ainsi l'office de tampon, et empêchant conséquemment les mouvements
soudains, on évite ainsi que la matrice n'éprouve un vaide trop subit
qui la ferait tout à la fois s'affaiblir, et par conséquent favoriser, et qu'on détermine
la stimulation par contraction par limitation qui cause les doigts ou la main
qui occupent son office. il est nécessaire encore, lorsqu'on fait l'avouchement
de l'enfant, d'être prudent que d'une manière lente ou précipitée selon que les
contractions utérines auront plus ou moins d'énergie, et autant que les pulsations
du cordon ombilical, et les forces de la mère pourrions le permettre à cet effet.
plusieurs accoucheurs ont prescrit de battre l'enfant qui jusqu'aux ossements,
et d'attendre en cet état les contractions utérines. ce procédé surtout utile lorsque
l'hémorragie est arrêtée, et lorsque la femme conserve avec docilité, est
d'autant plus avantageux qu'on évite par là la compression du fœtus ombilical
et que la pression des fesses de l'enfant sur l'office est propre à exciter les
contractions et le resserrément jusqu'à des bords de la Matrice. Mais
lorsque l'hémorragie continue, avec force, ou lorsqu'elle a été abondante,
et lorsque la femme est faible, si l'on tarde aussi trop longtemps
à extraire l'enfant, il arrive le plus communément qu'il prenne

augu'il viens si foible qu'il n'a beaucoup d'pain. à lui commencer la vie... ou
inter et inconvénient nous préferons, et nous avons presque toujours réussi en attirant
quelque ment les pieds du fœtus, et en les refoulant alternativement, d'une manière
que par ces déplacements et ces mouvements successifs, ~~la tête et les épaules de la matrice~~
se trouvent continuellement sollicitées à se contracter. Desque les fesses sont engagées
dans l'orifice, si les forces de la femme et les pulsations du fœtus le permettent, il
est sage et très utile, alors de ne continuer l'extraction qu'avec les contractions
utérines; mais si elles sont lentes, et si surtout la foiblesse de la femme ou
la perte sont grandes, il est ~~plus~~ ^{plutôt} que prudent alors de continuer l'extraction
du fœtus ainsi qu'enotis venons d'exposer, et surtout d'une manière à ne que les
ligaments vertébraux, et la moëlle épinière, ne soient pas exposés à une extension
et un tiraillement qui les plus ordinairement occasionnent la mort des enfants qu'on
extraît par les pieds. (A) D'ailleurs quelque sage ment continuée que soit la lenteur et la
marche ^{ou avec laquelle} ~~on~~ ^{on doit} faire cette extraction, il est encore essentiel en l'exécutant,
d'appliquer une main faible entre de la femme, afin de tenir les parois de la matrice
au degré d'approchement et de resserrement que ses fibres acquièrent successivement
à mesure qu'on la désemplit, parce qu'on s'oppose ainsi à l'espèce d'atonie ou elle tombe
après une contraction, et à la dilatation successive, qui en est la suite, laquelle ne
trouve au cune résistance, aucun point d'appui qui puisse l'en empêcher. Cette
dernière précaution, doit encore être suivie de celle, de comprimer encore le ventre
de la femme après la sortie de l'enfant, parce que si l'on y manque, la matrice peut
tomber dans l'inertie, et causer une perte d'autant plus dangereuse... que l'on la rendra
alors davantage à éviter sa contraction. Cette compression doit même s'étendre
après la délivrance, parce que ~~les vaisseaux~~ ^{les vaisseaux} du bas ventre qui étaient comprimés
pendant la grossesse par le volume de la matrice, cessent d'être trop immédiatement
cédent facilement à l'effort du sang qui se porte alors et concurremment avec
celui de la matrice, avec d'autant plus d'abondance et de facilité, qu'il se trouve
moins de résistance. Or ces vaisseaux se trouvent gorgés, tandis que la tête se trouve
immédiatement privée de la proportion de celui qui avait coutume de lui se faire
il s'en suit aussitôt un inconvénient des symptômes et souvent des convulsions mortelles.

(A) nous ne croyons pas devoir répéter ici l'extrait ou avec femmes entières avec garde d'eau.
Notre intention n'est pas de les faire.

14. D'après ces écrits, exacts, variés et approuvés par de nombreux
 pour nous dispenser de les étayer des raisons que nous fournisseront les auteurs,
 nous pourrions ici tout autre. Vétérin puole le savoir, quel on peut donner
 aux femmes atteintes de cette cause par le décollement d'une portion de
 placenta implanté dans l'intérieur de la Matrice; Mais peut-on en espérer
 les mêmes avantages, lorsque l'hémorragie est la suite d'une mauvaise
 situation du placenta, c'est-à-dire de son implantation fautive?

Si l'on fait attention qu'il n'est d'abord et si on peut s'opérer, sans
 entraîner à chaque instant un plus grand décollement du placenta, et sans
 conséquemment augmenter l'hémorragie, la danger qu'inspire une pareille
 circonstance, est bien propre à déterminer aussitôt à l'incubement fœtal;
 mais faut-il toujours prendre ce parti extrême? avant de s'y résoudre,
 il nous parait convenable, d'avoir égard à l'intensité de l'hémorragie,
 aux forces de la femme, et au plus ou moins de volume du placenta implanté
 sur l'orifice. en effet si l'hémorragie n'est pas considérable, si on a une petite
 portion du placenta à détacher l'orifice, si la femme n'est point affaiblie,
 enfin si les contractions utérines ont déjà lieu, et si la dilatation de l'orifice est
 déjà commencée, et permet de soulever les membranes, et la tête du fœtus, alors
 il suffit souvent d'opérer les membranes, parce que les eaux en s'écoulant,
 permettront aux parois de la matrice de se rapprocher et de se rapprocher au plus
 intimement le corps du fœtus, de la tête poussée vers l'orifice, et appuyant
 sur la portion décollée du placenta, ~~compressions~~ y fera une compression
 suffisante pour arrêter l'hémorragie, et mettre ainsi la nature dans
 le cas de déterminer seule l'accouchement. ~~Ce raisonnement~~ ^{raisonnement} est déterminé et avoué
 par l'expérience. Juellic (A) nous donne l'observation d'une femme qui était
 prise d'une perte causée par l'attache d'une portion du placenta sur l'orifice,
 il conseille de rompre les membranes, et s'exprime ainsi: " L'hémorragie
 " commença à se calmer des que les eaux furent évacuées, et elle cessa tout
 " à-fait aussitôt que l'orifice eut couché l'orifice interne, et comprimé.

(A) Juellic obs. 18. Page 362. Tom 2^d.

1. Les douleurs augmentèrent, la tête dilatée insensiblement
2. l'orifice de la matrice, et comme elle était petite, elle baissa de plus en plus, insensiblement
3. que quelques douleurs de plus délivrèrent la malade &c. &c.

Deux autres observations à la suite de celle-ci, prouvent encore la bonté de
cette conduite, et le succès de ce procédé. (A) Nous avons nous même le témoignage
de son avantage dans le cas suivant.

10. En 1787. une Dame de cette Ville, Vers le neuvième mois de sa grossesse,
me pria vers le soir de passer chez elle. m'y étant rendu aussitôt, je la trouvai
couchée, me disant qu'elle s'y était mise, parce qu'au retour de la promenade,
elle s'était aperçue de perdre un peu de sang, sans cependant éprouver aucune douleur
m'ajoutant que depuis qu'elle était couchée, elle ne perdait plus, mais qu'elle était
extrêmement inquiète. Je cherchai d'abord à la tranquilliser, et sans m'assurer
de son état de peu de trouble son imagination naturellement vive, celui trouvant
d'ailleurs le pouls ni foible, ni dur ni fébrile, je me contentai de lui recommander
le repos le plus parfait, de ne point souper, et de prendre vers l'heure du sommeil, un
julep fait avec un verre d'infusion de tilleul et trois gros de sirop d'opium. mes conseils
furent suivis, le sommeil fut bon, la perte ne reparut point, et au bout de trois à quatre
jours de repos eut que je recommandais, ainsi qu'un régime adoucissant, et quelques
boissons rafraichissantes. je la trouvai si bien portante que je crus l'aller faire visite
environ trois semaines après ce premier accident, cette Dame se trouvant dans l'habit
prise de quelques coliques, m'envoya mander aussitôt. me trouvant absent, étant
à un château distant de trois lieues de cette ville, ne pouvant y aller, après m'en
chercher cinq heures de passerent avant que je pusse être arrivé auprès de cette
Malade. je la trouvai assistée d'une sage femme qui me dit qu'il y avait perte,
mais qu'elle n'avait pu reconnaître ce qui se présentait à l'orifice qui était peu
dilaté quoique les douleurs eussent été devenues à autre assez vives. je l'osai d'une
qui survint pour examiner l'état de l'accouchement. je reconnus bientôt que



20 L'orifice situé en arrière dans la cavité du sacrum, étoit dilaté de la
 largeur d'environ un ou deux Livres, et que dans ~~l'infirmité~~ ^{l'infirmité} son étendue étoit
 retournée en devant sur une portion du placenta, et en arrière sur les membranes
 qui étoient encore intactes et ne permirent de faire à travers leurs parois
 la tête du fœtus. Dans cet état, **A** l'hémorragie n'étant pas bien considérable,
 et la malade jouissant d'ailleurs de toutes ses forces, je crus devoir suivre
 la pratique de suellie. en conséquence je rellevai d'abord le ventre de la
 malade qui étoit très inclinée en devant et j'y appliquai ensuite une
 main, afin de contenir et de comprimer le corps de la matrice, tandis qu'une
Une doigt introduit dans le vagin, comprimait fortement les Membranes
 qui se rompoient avec zèle. j'attendis alors à voir si ~~l'écoulement~~ ^{l'écoulement}
 des eaux et la compression de la tête de l'orifice et du placenta
 suffisoient pour l'opposer à l'hémorragie. Mon attente sur
 l'exemple: ou à sa suite l'arresta. les douleurs devinrent successivement
 plus fortes, la tête s'engagea, et au bout de quatre heures, cette dame fut
 délivrée naturellement d'un enfant bien vivant, et qui jouit encore de
 la meilleure santé.

Après ces faits s'il est permis de ne pas se hâter toujours, dans tout qui nous
 coupe; à recourir à l'incision forcée, il faut aussi quelque confiance
 dans la nature ait des forces. en effet si la femme étoit faible, si l'hémorragie
 étoit considérable, si le placenta neouroit en grande partie ou tout à fait
 toute la circonférence de l'orifice utérin, tout cela pourrait être nuisible
 et souvent préjudiciable à la mère et à l'enfant, et nous pensons que si
 l'hémorragie est, ou a été considérable, l'on ne peut balancer à terminer
 aussitôt l'accouchement, sans quoi il est rare de sauver l'enfant.
 cependant l'on a des exemples, où le placenta est sorti le premier sans
 danger pour la mère et pour l'enfant. suellie (A) nous en donne la preuve
 dans plusieurs observations. Dans l'une, il portait une femme qui étoit

(A) suellie obs. III et IV. pag. 34 et 35 de l'ouv. 1^{re}

beaucoup affoiblie par l'hémorragie considérable, qu'elle avoit depuis plusieurs
seures. mais l'écoulement s'arrêta, et presque arrêtée, elle revint à donner aux forces
et l'achèvement de sa maladie au moyen de gelées crues, et par l'application de ligatures
chaudes aux extrémités. // avec ces précautions, et ces accouchées, ont obtenu l'issue
// ou arrivon toujours après plus de deux, les extrémités recouvrent leur chaleur
// naturelle, et les boutons reviennent. pour lors voyant que le placenta s'arrêtoit
// le plus souvent, j'ai mis en usage, après qu'elle étoit malade accouchée. &c.

Dans une autre observation, il s'agit d'une femme à laquelle il avait couru quelques jours auparavant des foins pour une perte, s'étant renouvelée lorsqu'il arriva, et trouvant que les eaux étaient coulées, et que le placenta étoit engagé dans le bassin, il profite d'une douleur pour l'extraire, et continue ainsi à aller et venir, et immédiatement finit de celle-ci enfant qui vint vivant quoique le placenta fût décollé. Le dernier d'enfin publié fait encore mention de quelques autres accoucheurs plus ou moins heureux qui se sont terminés *factis* par les mêmes moyens, mais on blâme lui-même de ces succès, et consulte par un des écrivains de la parité quel on croit, pour une pareille circonstance, il lui fait répondre celui-ci en l'exemple (B) d'une femme qui éprouvait une perte causée par l'implantation ou l'absence sur l'orifice. comme les douleurs étaient légères, et que la perte n'étoit pas bien considérable, il attendit quelques jours, mais voyant que la perte devint plus considérable, il dilata peu à peu l'orifice, perça les membranes à côté de l'orifice et pendit au bas matrice ou il faisait les piéces d'enfant, qui vint en vie.

" 2^e Si un lieu des cas n'est pas stable pratiqué, à la fin de son Observation, on observe dans un nouveau longin avant l'acte de l'infant, demandant qu'il était absolument en l'air. L'extraction est une qu'on pouvoit obtenir à son tour, par l'application de ces fortes de cas, outre les infans nés.

Tout est un petit danger, et d'après l'autorité d'Eschellie, nous pouvons dire que lorsque l'hémorragie est considérable, ou lorsque la femme est déjà affaiblie, l'on ne doit pas balancer à porter à la nature une main secourable, surtout lorsque l'orifice se trouvera aminci, dilaté, ou favorablement disposé pour permettre à...

69. distolion et l'avouement. Mais quel parti faudrait-il prendre si
cet orifice était très peu ouvert, ou si il était trop rigide, pour percer sans
violence de pénétrer dans la Matrice, et invinciblement pour se l'enlever
puisque disent quelques auteurs: Mauriceau (A) appelle auprès d'une in-
prise d'une porte causée par l'implantation du placenta sur l'orifice, qui
était même étalé, fut près de quatre heures avant de pouvoir s'extraire
sans danger, avec les quels il parvint pourtant à pénétrer dans la
matrice. M. de la Roche rapportait dans ses cours, avoir vu un accoucheur
travailler près d'une demi-heure pour l'orifice qui se trouvait ap. un ul-
cère et de la largeur d'un onguet, un cuide dix lignes avant de pouvoir
y passer la main, pour aller chercher les pieds, en passant autant de
heures à vaincre la résistance de l'orifice, n'at au point d'indécision
s'il y causait un engorgement ou une inflammation funeste, et surtout
si on ne parvenait à arrêter que l'hémorragie continuant aussi longtemps,
nécessaire ainsi les jours de la mère, et de l'enfant! Mais pour ne
critiquer ces dangers en montrant à tous le orifice de l'orifice, et en
s'opposant à l'hémorragie par l'application d'un tampon de loup-
grique et au lieu (B) servir dans son emploi au même inconvénient,
et que dans cette circonstance il lui paraisse même favorable par
analogie, nous avouons que nous n'y avons pas la même confiance,
ni qu'il ne peut remplir avec efficacité l'indication que prescrit cette
oppression d'hémorragie, en effet la contraction de la matrice ne peut produire
ni le resserrément ^{apparaît} des vaisseaux ouverts, au contraire plus elle se contracte
plus la dilatation de l'orifice, qui avec la fièvre augmentera, et
entraînera conséquemment un plus grand décollement du placenta
~~et~~ et une perte plus abondante, et dangereuse. D'ailleurs l'éponge ne
peut servir de soutien solide au fœtus que l'on desire d'extraire, car la
dilatation de l'orifice ne peut s'opérer sans que des lésions se fassent
les uns des autres, d'où il résulte plus de mal, et il n'y a plus de

A) Mauriceau obs. l. IX. Cour. fig. 30.

B) de la Roche obs. fil. les cordes de sang l. 2. p. 23.

point de compression entre le point comprimé, et le point de compression, ou si l'on veut le premier caillot. Formé ne poudra plus à l'embouchure des vaisseaux qu'il doit comprimer, et successivement plusieurs vaisseaux ouverts, ne seront plus soumis à une pression suffisante, si elle ne peut le servir qu'à vers qu'il y aura assez de sang pour ne plus faire qu'un même caillot continu, et qu'après que le décollement du placenta sera assez considérable, et l'hémorragie, quoiqu'elle occulte, assez abondante pour être funeste à la mère et à l'enfant.

Celle est notre manière de voir sur cet objet. quoiqu'elle ne s'adapte pas avec l'opinion de M. Le Cour qui d'ailleurs ne cite aucun raisonnement à l'appui de sa méthode, elle ne nous empêche pas d'en admettre une autre, qu'il a employée parce qu'elle remplit avec succès, dans les cas qui nous occupent, le même effet que la tête de l'enfant abandonnée aux efforts de la nature, et appliquée sur l'orifice et sur le placenta, et appliquée sur l'orifice et sur le placenta à distance suffisamment à l'orifice de la matrice pour pénétrer dans la fente, perue les eaux et imagine l'expédient suivant. J'appliquai, dit-il, la portion supérieure qui se présentait sur la paroi interne de l'orifice, si elle était décollée, et j'eus maintes avec deux doigts dans cette situation, pendant que je débatais de tous côtés l'orifice avec les autres. cette manœuvre qui seroit si à craindre, été rapportée par personnel, et qui est très sûre et très salutaire, m'eut été continuée le sang ne coula et je parvins par degrés à enfoncer mes doigts si profondément pour atteindre un pied qui n'était pas éloigné, par le moyen de ce pied, j'amouai les lèsses à l'orifice, qui se tenait sur le placenta. la compression que j'y avais faite avec les doigts pour arrêter le sang. j'en ai alors agi de même, seule jusqu'à ce qu'il n'eût plus qu'un bras à dégager et la tête, au moyen de laquelle j'aidai sans fruit peu. L'enfant à vécu vingt jours, et la mère qui n'avait pas autant perdu que d'autres, quoiqu'elle fût dans la même situation, a été très promptement rétablie.

Nous avouerons avec plaisir que M. Le Cour a su voir l'avantage d'avoir procédé dans cette circonstance, avec beaucoup de sagesse, mais les faits (A) Le Cour, op. cit. p. 1. de sang fig. 226.

11. *La 174 M^{re} Jeanne âgée femme mariée à Thomas me^{re} appelée m^{re} C
sout p^r Martin quelle vint au secours d'une femme qui s'est rendue
occupée à l'autisme, et qui se croyait un peu saignée, soit instantané
de placenta qui s'ouvrait à peine et était de la largeur d'un pieu.
de vingt quatre sols, et présentant beaucoup de saignée et d'ouïe.
La malade était d'une faible constitution, et déjà affaiblie par le saignement
qui avait lieu depuis une heure. Comme je n'avais point encore trouvé d'au-
tre saignée de ces artères, dont je voulois faire tout le danger, je n'eus d'autre
ressort à mes forces, et j'eus recours au conseil. Comme on ne trouva point
d'autre que je desirais, et que l'on ne pouvait en venir à bout, j'eus recours
à la saignée terminai enfin à l'écarter l'ouïe, par où je jettai dans le
cervicé de deux doigts avec lesquels j'écarterai le plus doucement possible
la saignée de placenta qui se trouvait au-dessus, et qui m'empêchait l'écarter
bientôt je parvins aux membranes qui se déchirèrent sous le p^r de la main
que j'avais appliquée sur le ventre de la femme, et avec laquelle
je comprimais le corps de la matrice. Les fit un peu couler et s'étendre. La
saignée qui eut lieu par le coulant de saignée, et le point d'appui qui se fit
au corps de la matrice. La main que j'étais toujours appliquée sur le ventre,
me servit de point d'appui pour le coulant de saignée. Les deux doigts dans l'intérieur
du ventre, avec lesquels j'atteignis le ventre de l'enfant qui se présentait, et
bientôt à l'un des pieds que j'écarterai et que j'engageai dans l'ouïe.
L'autre se venant alors que l'hémorragie était arrêtée, sans réfléchir qu'elle
se faisait par le p^r de la saignée et la portion de saignée qui se présentait au p^r de la saignée,
et ne faisant attention qu'à la saignée de l'ouïe que je voulois opérer
sans violence, je me mis à l'écarter par le p^r de la saignée, et de l'écarter
avec les contractions utérines qui commencent à se faire sentir. Lorsque je
faisais un peu à engager l'enfant dans l'ouïe, alors je glissai mes doigts
dans l'ouïe de la face interne pour aller chercher l'autre pied. Avec
un peu de peine et bien de la lenteur je parvins à le saisir, et à l'écarter hors
l'ouïe, alors réunissant les deux jambes, et profitant de l'écarter des contractions utérines
je parvins à finir l'écarter de l'enfant qui était en vie. Les contractions
utérines se réunissant expulsèrent bientôt le placenta, et cette femme se tira
fort bien de sa couche.*

Environ trois mois après et avec beaucoup, j'eus encore une satisfaction de ce succès et
pareille circonstance. M^{lle} Morange, autre sage femme de Neumes, m'envoya prier M^{lle} Maugé
de se rendre au secours d'une femme demeurant près St. Miém, aux Bourg de cette Ville.
comme M^{lle} Maugé était absent, et qu'il m'avait chargé d'aller voir les Malades, je me
rendis en la place où on le désirait. cependant comme on m'avait annoncé
qu'il s'agissait d'un cas grave, j'appelai M^{lle} Le Prieux accoucheuse très instruite, et l'amie
intime de M^{lle} Maugé, devoulois bien l'accompagner. il y consentit: rendus tous les
deux, auprès de cette femme qui paroissait d'une constitution robuste, nous la trouvâmes
cependant assez affoiblie par une perte que la sage femme nous dit exister depuis deux
à trois heures, et être causée par la présence d'un placenta involontaire, qui était très
peu dilaté. M^{lle} Le Prieux ayant vérifié le fait, reconnut effectivement que le
placenta se présentait, et recouvrait l'orifice qui était dilaté d'environ la largeur d'un
oeuf de trois livres. comme j'avais la main plus grêle et plus petite que celle d'une accoucheuse,
il me pria de terminer l'accouchement. j'y procédai de la manière suivante: entourant
un doigt autour de l'orifice, afin de découvrir l'endroit du placenta le moins adhérent, je
reconnus que les membranes étaient à découvert vers la partie latérale gauche, sans
gâcher d'autres recherches, j'appelai M^{lle} Le Prieux d'assistance avec une main
le corps de la matrice, et avec un doigt appuyé sur les membranes je les déchirai près
leur insertion au placenta, renversant alors en dessous et vers l'orifice, la portion
du placenta qui se trouvait ainsi flottante et détachée, j'eus maintins et la
compressai avec les doigts que je réunissais les uns aux autres, à mesure que je cherchais
peu à peu à pénétrer dans l'intérieur de la matrice. comme l'orifice résistait de la
résistance pour y passer la main en entier, voyant en outre que les sang cessait de
couler, et ayant d'ailleurs l'esprit encore vaillant, de l'avantage que j'avais obtenu
de n'opérer dans ces cas qu'avec douceur, je me déterminai à laisser dans l'orifice
mes doigts réunis en forme de force, avec lesquels je faisais de temps à autre effort
pour pénétrer plus avant, et introduire ma main entière dans l'intérieur
de l'organe: j'y parvins peu à peu sans aucune violence, et je saisis bientôt les
deux pieds du fœtus qui présentait l'épaule droite. les réunissant tous les deux,
je les attirai hors l'orifice, Mais étant qu'il ne fut plus comprimé, ~~les~~

[illegible]

seule; à l'aide de quelques legeres attractions et des cordons. j'eus ainsi
une satisfaction d'extraire avec deux enfants qui étaient des filles. la première
est morte huit jours après sa naissance, mais la seconde vit et se porte
très bien, ainsi que la mère qui fut quelques jours affaiblie plutôt à
raison de sa telle organisation naturelle; qu'en raison de la quantité de
sang qu'elle perdit pendant sa délivrance, ayant été beaucoup moins
considérable. qu'elle l'est, ordinairement, dans cette circonstance.

Autre de la Manœuvre que nous venons d'apporter, nous viendrait-
pas mieux, employer celle de quelques accoucheurs qui recommandent et dans
les cas qui nous occupent, l'expulsion du placenta avec le doigt ou avec un troiquart.
mais peut-on espérer de cette pratique? L'écoulement des eaux quel on
procure, nuit bien aux sarnis des matrice de se resserrer et de se réduire
à un moindre volume, mais ne s'empêche point de diminuer qu'imparfaitement
les artères vaisseaux uterins, et d'arriver point à ceux du placenta qui
fournissent aussi à l'hémorrhagie. D'ailleurs les fibres uterines ne peuvent
renvoyer par elles-mêmes sans ouvrir davantage l'orifice, et dans celui-ci l'air
plus le relâchement du placenta sera grand, et conséquemment l'hémorrhagie
sera considérable et dangereuse. De plus cette manière d'avancer les eaux
en tirant le placenta avec le doigt ou un troiquart nous paraît encore
dangereuse, parcequ'on peut déchirer le cordon umbilical, ou au moins
quelques unes de ses racines principales, et on l'expose ^{ainsi} à faire perdre l'enfant.
on peut de même l'offenser grièvement, si l'on s'agit d'un troiquart, parcequ'une
main peu exercée, peut le pousser trop loin, et blessant le corps ou la tête du
fœtus qui se trouve ordinairement appuyé sur le placenta. d'après ces
inconvénients, cette manœuvre ne peut être propre à conduire à
la perte qui existe, et qui ne peut être que par la délivrance complète,
ou par la compression de la portion détachée du placenta, et des vaisseaux
uterins ouverts, ainsi que nous venons d'en citer des exemples. Viendrait-on
qu'il est plus avantageux de passer la main à travers la déchirure faite
au placenta, pour aller chercher les vides de l'enfant, non seulement
parce que la compression qu'elle exercera tant sur l'orifice que sur

le placenta; est propre à arrêter l'hémorragie, mais encore par ce que ne se
résistant pas directement au l'orifice, elle devient plus douce, et garantissant beaucoup
mieux la dilatation et la sensibilité de cette partie. mais n'obtient-on pas tous ces
avantages en n'opérant cette dilatation qu'avec douceur et avec lenteur, et en
comprimant ainsi que nous l'avons dit la portion décollée du placenta. D'ailleurs
quelques risques ne court-on pas, lorsqu'après avoir déchiré d'abord le placenta avec le
doigt ou le trois quart, l'on cherche ensuite, à pousser dans la matrice l'enfant, en effet la main
ne peut passer par une si petite ouverture, et l'on est obligé de pousser avec force
au corps du placenta d'un déchirement plus considérable qui doit donner lieu, soit
même à une hémorragie abondante, et d'autant plus dangereuse, que l'on ferait
plus long temps à terminer l'accouchement. D'ailleurs, l'effort que l'on doit employer
pour parvenir dans la matrice, s'exécute debas en haut, et non pas en haut
à soulever le placenta en totalité, pour que si son adhérence soit peu intime, et
ne peut-on pas ainsi le détacher de toute la circonférence de l'orifice, avant qu'on ait
pu atteindre aux pièces de l'enfant, surtout si l'orifice présente de la rigidité, ce qui
ouvre ainsi deux sources à l'hémorragie, qui pourraient être funestes à la
mère et à l'enfant. Mais supposons que le placenta soit assez adhérent pour résister à
l'impulsion de la main, peut-on espérer qu'il résistera de même à l'attraction de l'enfant,
surtout lorsqu'il se trouvera d'un volume un peu considérable. ne doit-on pas craindre que les hanches
ses épaules, ou la tête ne soient point arrêtées par le boudoir que forme l'endroit déchiré, et
que par les efforts que l'on sera obligé d'employer, ces parties n'entraînent point avec elles
la totalité du placenta, nouvel accident qui peut laisser seules dans la matrice les membranes,
dont l'attraction pénible et difficile, expose l'accouchement à en laisser dans l'utérus
des portions, qui souvent donnent lieu à une perte, ou au moins à une suppuration putride
et conséquemment à une fièvre de mauvais caractère.

D'après ces inconvénients, et les faits que nous venons de citer, nous pensons donc
qu'il est plus convenable de détacher le placenta du côté où il présente moins d'adhérence,
de déchirer alors les membranes au bord de cette masse, pour aller de suite saisir les
pièces du fœtus, lorsque la souplesse ou la dilatation de l'orifice le permettront, et
lorsqu'au contraire il opposera trop de résistance, il nous paraît préférable d'employer
de chercher à déchirer les membranes, et à pousser les pièces de l'enfant par tous les efforts
la portion décollée du placenta par l'orifice, et de les comprimer suffisamment pour que
l'hémorragie s'arrête, et pour que l'enfant ne dépende pas peu à peu de la matrice.
Cependant si l'extrême rigidité et le peu d'ouverture de l'orifice, empêchent d'extraire avec
les membranes, il paraît alors que l'on devrait d'abord, par le moyen d'un instrument qui la dilate
serait devenue suffisante pour permettre d'extraire les deux, et de comprimer le placenta.

enfon s'il arrivoit que le placenta fut expulsé en totalité, et poussé par le fœtus jusqu'à la vulve, après l'avoir caillé, il parait préférable ainsi qu'écrit M^r Baudelouque (A) d'extraire l'enfant avec le forceps, de préférence à le délivrer par les pieds, parce que pour y parvenir, on passerait intérieurement l'écumeux, et souvent inutile, et que le moindre délai est alors préjudiciable à la mère et à l'enfant. Cependant il nous paraîtrait plus prudent d'écarter, qu'il vaut mieux alors extraire de suite l'enfant, qu'il s'en abandonne l'expulsion aux seules forces de la Nature. En effet il faut observer que l'application du forceps n'est dans ce cas préférable à l'extraction de l'enfant par les pieds, qu'autant que la tête est assez avancée dans l'excavation du petit bassin, et qu'autant que son épaisseur n'est pas traversée l'orifice utérin, et le col étroit supérieur, parce que si ces conditions ne se trouvent pas, on serait obligé d'appliquer cet instrument au col étroit supérieur, Manœuvre très souvent inutile, impraticable, et dangereuse, ainsi que nous l'avons démontré dans Notre Mémoire sur l'abus de cet org.

Quoiqu'il en soit, les causes que nous venons d'examiner, ne sont pas les seules qui peuvent donner lieu à l'hémorragie pendant l'accouchement. et même peut résulter de la rupture de quelques vaisseaux sanguins qui de la Matrice se joignent aux membranes, et dont l'engorgement peut être quelquefois assez considérable pour fournir un écoulement capable de donner de l'inquiétude. La Motte (B) a remarqué une particularité, et pour ne laisser aucun doute à cet égard, nous nous faisons un plaisir d'insérer ici l'observation de cet auteur.

- 1) une femme de cette ville étant au travail, m'en voya prier le trois juillet de l'année 1687. de venir la voir. Je trouvai qu'elle étoit allée aussi bien qu'on pourroit le souhaiter. l'enfant étoit bien placé, l'avant de chaque ventrière, faisait sautiller, et dilatoit l'orifice intérieur de la matrice, et donnoit occasion à l'ouverture de quelques petits vaisseaux qui donnoient aux glaires qui forment une tige et interne de sang, et cette tige augmentoit à mesure que la tête avançoit, par l'ouverture plus considérable de ce sang fortoit, de manière qu'il venoit comme une petite saignée, laquelle diminuoit au moment que la tête retrogradoit, ce qui me faisoit espérer que l'accouchement qui alloit finir selon toutes ces Marques, termineroit ce léger écoulement. Mais deux heures qui

(A) art des acc. Page 39 Com. jor. & D.
(B) La Motte obs. lix. Page 177.

Manifeste ~~avant~~ ^{alors} avant d'écoulement des eaux, parce que les Membranes
ne se partagent point, ou plutôt n'éprouvent point le froissement des fibres utérines, ~~et~~
parce que ne se partagent point exactement lorsqu'elles sont enroulées au sang la tête de l'enfant.
Dans la perte au contraire qui vient du décollement d'une portion du placenta, le sang ne s'écoule
particulièrement qu'après la douleur, parce que sont alors quelques fibres utérines sont moins
froissées et que les parois des vaisseaux plus relâchées laissent échapper les fluides qu'elles
contenaient. ces différentes faiblesses sont bien capables d'exciter l'attention, et de
venir en aide contre un parti contraire à cette circonstance. aussi, si l'accouchement avait
été mieux venu dans la pratique des accoucheurs, si n'eût pas aussi bien reconnu
la cause de l'écoulement qui effrayait tant les deux femmes dont il parle, il n'eût pas
manqué de partager leurs effrois, et cet effroi aurait pu l'entraîner dans une conduite
funeste à la mère et à l'enfant. cependant quoiqu'il soit facile de distinguer cette
espèce d'hémorragie, & celle causée par le décollement du placenta, il ne faut pas
néanmoins rester dans une sécurité oisive, lorsque l'écoulement se trouvera, après
un certain temps, nous inquiéter, ou pour faire craindre quelque décollement des Membranes
ne parviendrait à une fois arriver, jusques aux bords du placenta. Dans ce cas, il nous
paraît prudent et même nécessaire de rompre de bonne heure les Membranes,
parce qu'elles ne sont plus tendues, elles ne sont plus sollicitées à se séparer de la
matrice, et ~~parce que~~ parce que éprouvant alors et partageant le froissement
des fibres utérines, elles ne tendent plus à ébranler le placenta, mais encore
parce que le vuide qui résulte de l'évacuation des eaux, permet aux parois de la
matrice de se rapprocher assez exactement du corps du fœtus, pour que les
vaisseaux rompus soient suffisamment comprimés pour arrêter l'hémorragie
est d'après ces principes que nous avons vue devoir nous supporter dans
les cas suivants.

14. en 1788. M^{lle} D^{xx}. à la seconde couche, éprouva après trois à
quatre heures de douleurs assez légères, incertaines si considérables et si habituelles que
je me suis vu la faire se coucher, et d'examiner l'état de l'accouchement, comme
l'orifice n'était dilaté que de la largeur d'un peu plus d'une paille de vingt quatre fois,
et que les membranes étoient après, flasques, pour me permettre de saisir la tête du

gates, et comme d'ailleurs il ne paroissoit plus d'écoulement, j'engageai
l'amalabe à première palme, et je cherchai de mon mieux à l'attacher, et
quelques autres douleurs parurent sans aucune hémorragie, mais lorsqu'elles
devinrent plus énergiques, l'écoulement devint chaque fois plus considérable,
demandant que j'eusse de voir y mettre fin en procurant l'évacuation
des eaux, quoique l'effus ne trouvat encore dilaté que de six ou sept
ou au plus trois lignes. L'hémorragie cessa aussitôt après et se reprit
plus. L'accouchement fut un peu long, mais se termina très heureusement
pour la mère et pour l'enfant. après sa sortie, j'examinai attentivement
s'il n'y avoit point une portion du placenta détachée, j'en eutrouvai
aucune, et remarquai qu'il étoit implanté dans la partie antérieure
et latérale gauche de la matrice. j'attendis plus d'une heure, la
contraction de cet organe, avant de pouvoir opérer sûrement et sans
danger, l'extraction de l'arrière fais que j'examinai après sa sortie, et
me donna lieu de remarquer que la déchirure des membranes n'étoit
pas éloignée de plus de trois doigts du bord inférieur du placenta,
quoiqu'il en soit, il m'est permis d'ajouter quelques autres réflexions
à l'observation de la motte, nous dirons qu'il n'est point étonnant que
la frayeur que causent à sa malade, les propos indiscrets des deux femmes
qui l'assistent, eut donné lieu au travail de l'enfantement. Les rapports
intimes de l'une et de l'autre, se expliquent assez la cause, au trouble
de l'une apporte malheureusement, et conséquemment des changements
notables dans l'autre. aussi est-il très important dans l'opération
intéressante de l'accouchement, que les fonctions intérieures et extérieures
ne souffrent aucun trouble subit et violent, capable d'augmenter
ou d'affaiblir l'énergie vitale, et de faire tomber la matrice dans
l'atonie, ou d'y déterminer une irritation suffisante pour produire
l'écoulement du placenta, ainsi que peu en rapporte un exemple
sensé. et ailleurs parle d'une femme qui étoit si près d'accoucher
et qui s'étant mise en colère, fut prise d'une fièvre violente dont elle mourut.

à l'ouverture de son cavare, on remarqua que l'intérieur était rempli de sang, & que le placenta était collé dans presque toute son étendue, au reste quant à l'enfant de la Morte qui croyait quel enfant n'aurait beaucoup souffert par ses propres efforts, elle n'était cette dépression des mouvements de fœtus, & qu'unique quelques uns commencent très bien d'allure les mouvements de l'enfant, mais sans apercevoir qu'ils ne pouvaient pas qu'ils fussent de la nature en fait le principal, et que l'enfant soit un objet passif sur lequel elles agissent faiblement avec plus ou moins d'énergie, et souvent devenant une barrière indifférente, plus ou moins d'énergie, et souvent devenant une barrière indifférente, comme il est. mis sous l'action de la vie, & même indirectement de tout corps, comme il est. suite de sa naissance, en jetant les yeux sur une femme lors de sa mise au monde dans les derniers instants du travail.

Parmi les autres causes qui peuvent donner lieu à l'hémorragie utérine pendant le travail de l'enfantement, on peut encore compter la rupture du Cordon ombilical. La Motte parle d'une femme qui après la rupture des Mems donna une perte assez considérable... ne pouvant attacher entre les pieds de l'enfant, lorsque la tête étoit très avancée dans le bassin; et repugnant à l'emploi de l'instrument, il confia à la nature le soin de le décoller. Après la sortie de l'enfant il s'appercut que le cordon ombilical étoit passé trois fois autour du fœtus, et qu'il y avoit une assez grande écorchure; il y avoit une excoriation, d'où sortoit le sang, ayant observé que le placenta n'étoit détaché dans aucune de ces parties. C'est la première fois que cet habile accoucheur remontra un pareil cas, et nous ne pourrions pas en d'autres faits qui le justifient. D'après ce fait il est assez difficile d'en assigner la véritable cause, à moins de l'attribuer à un vice d'organisation du cordon ombilical ou à la rupture de quelques uns de ses vaisseaux causée soit par l'exès de plénitude ou d'engorgement, soit par son défaut de longueur. Si naturel soit accidentel, dans le cas surtout où le placenta se trouverait après adhérent pour résister au tiraillement qu'il doit éprouver. Or dans le cas contraire, soit à dire lorsqu'il glisse sans peine, on ne voit pas qu'il y ait de tels accidents. Mais comme nous sommes tous d'accord sur ce point, nous inclinons qu'il eût été plutôt, quelque chose de plus, aussi est-ce à la suite de longueurs que la tête s'arrête de l'accouchement attirée.

Les fœtus qui arrivent après l'écoulement des eaux, quoique cela soit possible, elle s'en va par la plus ordinaire, en effet selon les progrès du travail et l'infatigabilité de la matrice, ne s'approcherait-elle pas plus exactement du corps du fœtus, et n'y a-t-il pas ainsi le même espace entre l'ombilic et le placenta. vous dirait-on que la tête du fœtus en s'engageant dans le bassin doit déranger ces rapports, parcequ'à mesure qu'elle baisse, le sillon du col se noue, les ~~membranes~~ ligaments s'abaissent, et ainsi s'ordonne le lieu de son insertion, mais fait-on attention que la tête du fœtus ne s'abaisse vers la vulve, qu'autant que les contractions utérines pour évacuer les eaux, et sans que les parois de la matrice ne s'éloignent les unes des autres plus intimement l'un des fœtus, et sans que le corps de la femme soit baissé et ne soit descendu davantage dans le bassin, ce qui établit ainsi une compensation, et rend le plus souvent égale la distance qui existait auparavant entre les deux points d'insertion. D'ailleurs sans s'arrêter plus long-temps aux preuves surabondamment, examinons encore non la seule l'observation: combien de fois l'hémorragie a-t-elle lieu, quoique le fœtus ait des dimensions ordinaires et plus que suffisantes? Mauriceau (A), cite plusieurs ~~cas~~ circonstances où il a trouvé le cordon très long, quoiqu'il soit attribué d'abord la perte qui existait à son défaut de longueur. combien n'est-on pas d'exemples d'enfants qui sont venus au monde et s'élevèrent, et sans aucun accident, quoique le cordon eut à peine cinq à six toises de longueur. entre autres faits de ce genre nous citerons le suivant qui vous est particulier. en 1787. j'eus appelé auprès d'une femme de cette ville, dont on ne pouvait me dire on extrême l'enfant qui se présentait. La tête du fœtus était effectivement passée hors la vulve depuis plus d'une demi-heure sans que jamais la mère eût pu dégager le fœtus. Je examinai d'abord si les épaules étoient bien placées, les trouvant bien situées, j'eus l'air de dire à dégager l'enfant.

(A) Mauriceau Tom. 2. pages 512. et suivantes.
et qui s'étant vu

L'ont aidait à opérer son extraction qui seule peut remédier ^{* à l'hémorragie.} sans accident. Si l'enfant
est effilé, une qu'on a vu sauter vers la vulve, la matrice se rapprochera jusqu'à l'union
du bassin, & en se relevant elle même franchera, et retirera en proportion les langes
de l'enfant, & arrêtera ainsi l'hémorragie à l'avantage de la mère et
de l'enfant, surtout à l'enfant ainsi que nous l'avons déjà dit, la précaution est utile et
nécessaire. Appliquez pendant l'extraction une main sur le ventre de la femme,
afin de soutenir les corps de la matrice, et de la maintenir au degré nécessaire.
Le relâchement qu'elle acquiert à mesure qu'elle se soulève, & qu'elle se relève, &
est à dire lorsqu'elle s'élève, ne doit que commencer à s'engager, & est
plus facile alors et la rupture, et de pénétrer dans la matrice par le cordon
ombilical, il y a aussi plus de danger à opérer cette rupture, car si
nous y parvenons, non seulement, on doit déranger la position de l'enfant, qui se
trouvant en telle situation, ne pourra plus s'engager facilement, &
mettra beaucoup plus d'obstacles à l'accouchement, tout est vu et prévu
d'avance, mais peut-être fust-il à la mère et à l'enfant. mais l'opérateur qui pour
éviter le danger, en se hâtant, fust-il, après avoir rompu le cordon, à retirer
l'enfant, tout est plus commode et plus expédient de le faire, surtout
si l'enfant est en telle situation, inutile et inutile, mais que dans les deux cas l'enfant
soit ainsi en telle situation à l'hémorragie, tout est vu et prévu, mais
surtout nous le voyons, qui ne manquera pas de succomber. Mais si l'enfant
est en telle situation, soit naturel, soit accidentel, fust-il
la cause d'un accident de l'enfant, & l'hémorragie qui peut être évitée
après l'accouchement de l'enfant, il devrait naturellement s'arrêter, &
ne devrait avoir lieu que toutes les fois que le cordon se rompt, soit
ce qui est, en outre, évidemment sans motif, aussi dans cette
circonstance, la rupture de la matrice, cet accident peut être évité
par la rupture du cordon, & qu'il donne à la femme les soins
les plus convenables et les plus analogues à l'intérêt de l'enfant, et
à l'état de l'accouchement ainsi que nous l'avons exposé précédemment.

On peut encore compléter parmis les causes de l'hémorragie utérine
pendant l'accouchement, la rupture de la matrice. cet accident peut être évité
par la rupture du cordon, & qu'il donne à la femme les soins
les plus convenables et les plus analogues à l'intérêt de l'enfant, et
à l'état de l'accouchement ainsi que nous l'avons exposé précédemment.

Entrouvé dans la garette de fanté (A) un fait à peu près semblable.
M^r Levert, Chirurgien de l'hôpital général de St. Jean d'Angely, propose
avoir été appelé, pour délivrer une femme dont l'enfant présentait le bras.
Depuis deux jours les eaux étoient coulées. la fœtusure du bras sorti jusques au
coudé, et la faiblesse de la femme l'engagèrent à aller aussitôt, saisir les pieds
mais en les saisissant, il sentit sur le dos de sa main, et même il entendit le bruit
du déchirement de l'orifice, dont il n'indiqua point auparavant l'état, et sans
s'effrayer de cet accident, il continua et termina son opération. il est à
remarque dit ce chirurgien, que dans cet état il n'y eut presque point de
saignement, c'est surtout dans les cas de callosité au col de la matrice, qu'il est rare
que la déchirure qui occasionne les efforts de l'accoucheur, ou l'incision que
l'on y pratique, soit suivie d'hémorragie, parce que les parties endurcies, rendent
ordinairement très peu de sang. aussi M^r Simpson, après avoir fait plusieurs
incisions autour du bord calleux d'un orifice avant que l'accouchement n'eût
eu lieu, assure qu'il ne sortit aucune goutte de sang. M^r Henspel ajoute
la même remarque en pratiquant les mêmes incisions en pareil cas et avec
le même succès. (B) Néanmoins si l'écoulement de l'orifice, l'hémorragie
devient considérable, il seroit imprudent d'en pas s'y opposer, ~~soit~~ en
favorisant la contraction de la matrice, soit par la simple irritation avec
les doigts, soit au moyen d'une injection d'eau et de vinaigre, ou l'application
d'un linge imbibé de la même liqueur, et si cela ne suffisoit pas, on
aurait ainsi quel'indique le célèbre M^r Louis, (C) la ressource de toucher
les lèvres de la plaie avec un pinceau de charpie, ou une éponge trempée
dans l'estence de crabes, ou quelque autre liqueur astringente, capable d'arrêter
le sang avec efficacité. C'est surtout au moyen d'éponges imbibées de l'une ou
de l'autre de ces liqueurs astringentes qu'il paroît convenable de s'opposer à
l'hémorragie qui seroit la suite de la séparation accidentelle de l'orifice
de la matrice avec le vagin. Cette solution de continuité peut être occasionnée
soit par les contractions utérines seules, la tête n'étant encore presque pas engagée
au détroit supérieur, soit par les efforts de l'accoucheur pour pénétrer dans l'utérus,

(A) Gazette de fanté N^o 8. année 1778.

(B) Voyez l'école pratique des accouchements Parpignon Page 194.

(C) Mémoire sur les contractions caluleuses de la Matrice par M^r Louis tom. 4. des Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie.

ouy faire rentrer une partie du fœtus qui y feroit mal placée. Le premier cas quoique
très rare, a été observé par un M. Mauge, notre intime ami. Comme il s'est réservé
l'avantage de communiquer à l'Académie, les faits dont il a été témoin, et la
Méthode qui paroit alors la plus convenable, nous ne parlerons qu'en passant de ce
que nous n'avons encore trouvé qu'une seule fois. En 1785. nous fûmes appelés
à un port d'Inde de cette Ville par un M. La Marquise Sage-femme, auprès
d'une pauvre femme qui depuis vingt quatre heures étoit dans le travail de
l'enfantement. L'épaule gauche se représentait au détroit supérieur, et y étoit engagée
à défaut d'enroulement. D'abord cette partie avoit engagé les membranes devenues à
l'anature de l'œuf d'accouchement. Cependant comme les douleurs utérines
n'avançoient pas davantage l'accouchement, la Sage-femme appelée s'aperçut
que l'épaule de l'enfant se représentait et voulut entreprendre de la relever dans
l'intérieur de la matrice, et d'y pénétrer. par ses efforts elle avoit rompu l'adhérence
du col de l'œuf. Dans presque toute sa partie postérieure, une perte légère n'étant
alors d'alarmer, je fus aussitôt appelée auprès d'elle. En que plus introduit
les doigts dans le vagin, je reconnus bientôt à la présence d'une portion d'intestin
dans le mal que je venois d'exposer. mon premier soin fut de repousser dans
la matrice cette portion intestinale déplacée, ce que j'exécutai avec assez de peine.
comme il me sembloit plus d'espoir, et que l'orifice de l'utérus me parut
très dur et très rigide, quoique suffisamment dilaté, je crus enfin d'obtenir
le relâchement nécessaire, devoi saigner cette femme dont le pouls d'ailleurs
étoit très élevé. quelques heures après je me mis en devoir de procéder à l'ac-
couchement, en vain comme je fis contraindre par un aide le corps de la matrice
comme j'allois chercher à pénétrer peu à peu dans la cavité, et à atteindre
le col de l'enfant. je ne saurois exprimer la difficulté que je rencontrais.
pour replacer cette épaule fœtale dans la direction du diamètre antérieur
du détroit supérieur. L'extrémité du corps de l'utérus étoit encore si grande qu'il
mefalloit me reposer plusieurs fois, tant ma main étoit serrée et enflammée.
mon malin ne perdis pas courage, et comme j'étais prêt d'atteindre

aux uisces de l'enfant dont les pieds repoussaient au fond de la matrice, je referai l'uterus souvent dans l'incision, plutôt que de retirer la main pour recommencer la manœuvre. Enfin après un quart d'heure de peines je parvins à fléchir les uisces et à atteindre ensuite les pieds, à l'aide des quels j'eus assez aisément l'extraCTION de l'enfant, qui était mort. après l'adellivrance de l'enfant, il me fallut faire ~~extraire~~ l'interstium d'interstium qui se trouvait d'enroulé et boursouflé, et pour m'opposer à la hémorrhagie, je recommandai à la femme de se tenir couchée sur le côté gauche, à laquelle eut le siège très élevé, et les uisces placés sur le ventre, ^{que j'aurais comprimé et maintenu au moyen d'un bandage de crin} de l'entourer à ma visite, je trouvais cette malade en très bon état, l'interstium n'était pas décollé, et j'espérais qu'en faisant rester la femme dans la position que je lui avais prescrite, la nature procurerait la réunion des parties ^{défectueuses}. mais le lendemain même la malade, et son intemperance ^{trouvant la sécrétion de lait} ~~augmentant~~ la sécrétion de lait, et donnerent lieu à un écoulement purulent au quel elle succomba le sixième jour de la couche. Malgré tous les soins reçus, c'est une pareille Circonstance.

Mais de quelle manière pourrait on supposer à l'hémorrhagie qui suivrait la rupture de la matrice dans une des parties de son corps. cet accident remarquable peut être la suite comme nous l'avons déjà dit de quelques obstacles apportés à l'écoulement soit par les uisces du fœtus, ou de la matrice, soit par quelque défaut d'organisation dans quelque point de la matrice. et qu'il est très probable qu'il y a un grand anéantissement de ses vaisseaux, soit naturels soit accidentels, ainsi qu'il arrive après un long usage de l'abortif. B. dans un cas, quodans les contractions trop vives de la matrice, soit par les propriétés affectées de la femme, soit par l'insistance de son corps qu'elle tendent à chasser, la partie du viscère qui sera la plus faible, la plus faiblement organisée, ou qui sera affaiblie et affectée dans quelque point, se déchire première et ne se déchire.

M. Camper dans ses observations sur le traitement des maladies des femmes dans le Nouveau, rapporte l'exemple d'une rupture de Matrice, qui était si morte depuis

son col, jusques à la moitié de son corps, quelle avoit à peine. L'épaisseur d'une ongue
de papier à écrire. presque tous les auteurs prétendent que cette rupture arriva le 1^{er}
ordinaire arriva dans l'engainage de col, comme étant le plus mince, et le moins
garni de fibres musculaires, cependant elle peut avoir lieu dans tous les points de la matrice.
Heister (A) rapporte l'observation de Bauguin qui trouva les intestins parties à travers une déchirure
arrivée au fond de la matrice, les replaça dans le ventre, et y mit la main jusqu'à ce que l'incision
se fut enfoncée, sous le pectoral, qu'il ne se vît plus de sang. M. Heister (B)
rapporte qu'il trouva deux femmes qui étoient mortes à la suite d'un accouchement, la
première dans l'une, que la matrice étoit rompue dans son fond, et dans l'autre, qu'elle étoit rompue
dans le côté gauche. Mauriceau (C) donne l'histoire d'une femme qui ayant succombé quatre
jours, aux douleurs d'un travail pénible, sans entrer en délivrance, présenta à l'ouverture de son
corps, au-dessous du col droit de la matrice, par laquelle l'enfant étoit tombé sans le ventre
ainsi qu'elle précéda. cette rupture avoit été commencée par les contractions inutilement
répétées de la matrice, et les efforts violents de la femme, pour faire avancer la tête du fœtus
qui se présentait la face en dedans et de côté, d'une manière que son plus grand diamètre se présentait
et devoit apporter à l'accouchement des obstacles insurmontables, aux quels on ne pouvoit
remédier qu'en rapportant de bonne heure, l'occiput à la position favorable, ou en délivrant
l'enfant par les viés.

M. Heister nous a communiqué l'observation d'une rupture du fond de la matrice pendant
le travail d'un enfant mort, et accident est arrivé à Rennes à la femme d'un Effetier, pour
la quelle nous avions été consultés deux ans auparavant à son premier accouchement, alors
les eaux étoient écoulées depuis deux heures, l'orifice étoit dilaté de la largeur d'un terre ordinaire
mais les bords étoient encore durs, mais et assez doux. Le fœtus étoit dans la position favorable, et
l'occiput étoit déjà avancé vers le trou ovalaire gauche. Comme les douleurs étoient faibles, et que le bassin
se trouvoit restreint d'avant en arrière, par l'applatissement de la symphyse des pubis, je donnai
trois à quatre ligues, et M. Haugé, qui assistoit cette femme, donna un punch de café et de
sucre et moi qui fus appelé, à six heures voisine l'état qu'on nous exposa, nous fûmes
avis, vu l'engorgement et la rigidité du col, et la plénitude de la Malade de
la saignée, et de lui faire prendre, aussitôt ~~un bain~~ ^{trois gros de sirop de sucre dans un verre de liqueur} ~~un bain~~ ^{pour la faire} et quelques douleurs devinrent plus
l'orifice se relâchoit, ~~et l'enfant vint sans difficulté~~, et quelques douleurs devinrent plus
puissantes pour faire avancer la tête, et la tête se trouva à l'obstacle qu'elle avoit à
vaincre. Nos conseils furent suivis, l'accouchement fut long, mais il fut heureux
pour la mère et pour l'enfant. Deux ans ensuite, M. Haugé ayant été appelé auprès
d'une femme devenue Grosse pour la seconde fois remarqua les mêmes difficultés à

(A) insit. de Chir. Paris 2^e Page 728.

(B) insit. de Chir. Paris 2^e Page 319.

(C) obs. sur. col. l. 2^e Page 206.

et qu'on passerait sûrement plus de temps à l'exécution qu'à faire la gastrotomie, et ensuite l'extraction de l'enfant par cette voie. au contraire il paraîtrait préférable de faire usage des instruments, lorsque la tête serait bien engagée dans le bassin, et surtout lorsque celui-ci ne présenterait au cun vice de conformation. mais si les pieds de l'enfant se présentaient, ou s'il étoit facile de les saisir lorsque quelque autre partie se présenterait, il seroit plus convenable de terminer aussitôt l'accouchement par les pieds, plutôt que d'ouvrir le ventre, à moins qu'il n'y eût un épanchement sensible de sang dans le ventre, ou à moins qu'pendant que la tête ou le corps du fœtus ne fussent tellement serrés dans l'endroit de la déchirure de la Matrice, que l'on courut les risques de l'augmenter en voulant y faire passer ces parties. avertis il est hors d' doute qu'il faille ouvrir le ventre, lorsque le fœtus y est passé en totalité et que cette opération ne peut augmenter le danger, et on n'eût point appréhendé de l'exécution. Nous n'eussions pas balancé à la pratiquer dans le cas où s'est trouvé Mr. Lorry. (A) ce Chirurgien fut appelé auprès d'une femme entravée depuis deux jours. trouvant que le front s'étoit plus abaissé dans le bassin qu'il étoit, il chercha à le repousser avec les doigts, et y travailla inutilement pendant trois heures, au bout desquelles la malade l'ayant prévenu que son enfant lui avoit donné deux secousses violentes et qu'il avoit remonté, il porta alors la main dans la Matrice, et l'apparut quel enfant n'y est plus contenu. dans cet état il se contenta de saigner la Matrice, à laquelle il trouva le puits plein, et resta depuis la nuit du 28. jusqu'au 29. Spectateur oisif, de ses anxiétés, des Synopes et de l'hémorragie qu'essuya successivement cette Malheureuse Victime après sa mort, il l'ouvre, et trouve dans le ventre l'enfant mort et dans un état de putrefaction et il remarque que la Matrice est déchirée au côté gauche.

Comment se peut-il qu'un auxiliaire remarque aussi sensiblement une rupture de Matrice, sans donner à la malade aucun secours, qu'une saignée qui ne pourroit qu'affoiblir ses forces sans remédier à l'épanchement qui s'étoit fait dans le ventre. comment a-t-il pu rester ainsi pendant deux jours tranquille Spectateur de l'agonie de la patiente, sans se déterminer à opérer l'extraction de l'enfant au moyen de la gastrotomie. d'ailleurs ne pouvoit-il pas prévenir la déchirure de la matrice, en évitant que le diamètre longitudinal de la tête, ne se présentât de front dans le bassin, seul obstacle à l'accouchement qu'il indique. il est vrai qu'il chercha à y remédier en soulevant le front avec les doigts, mais n'y réussissant pas, pourquoï ne chercha-t-il pas à saisir et à comprimer l'occiput d'une manière à le faire baisser davantage que le front, et à le rappeler ainsi à sa direction? si cette manœuvre ne lui eût pas encore réussi, ne devoit-il pas faire usage du levier, ou à son défaut d'une branche de forceps. Plus oult autres de ces instruments appliqués sur l'opisthion mastoïde, n'auroit pas manqué d'agir directement sur l'occiput, en le faisant baisser, et en élevant le front, et auroit ainsi réduit la tête à la position favorable. avertis lorsque ce Chirurgien s'apparut que l'enfant n'étoit plus contenu dans la matrice, pourquoï balancoit-il à ouvrir le ventre pour en extraire l'enfant. lors même que cette opération lui eût paru douteuse, il ne pourroit encore hésiter à la faire, parcequ'il ne pouvoit remédier autrement à l'épanchement de sang, à la putrefaction et à celle du placenta et du fœtus qu'il abandonnoit ainsi que la Mere à une mort certaine, à laquelle il les eût probablement soustraits, et principalement la Mere

puisque les forces étoient plus que suffisantes, et quelle luta pendant 48. heures
contre tous les Maux qui l'assiégerent.

quoiqu'il en soit, dans le cas qui nous occupe après qu'on a extrait l'enfant soit par les
voies naturelles, soit par celle qu'on a pratiquée au ventre, si la matrice ne s'est pas contractée suffisam-
ment sur elle-même, pour diminuer l'étendue de la déchirure, et si l'hémorragie a lieu, il faut aussitôt
s'y opposer en procurant le serrement du viscère ^{ou de bris} par l'insertion ^{de bris} avec les doigts, et par des injections
d'eau et de vinaigre, plutôt que par l'application de linges ou de poudres imbibées de la même liqueur,
ainsi que les recommandent quelques auteurs, parce que la présence de ces corps étrangers peut seule ^{enlever} terminer
l'hémorragie, et s'opposer toujours à la contraction exacte qu'on doit chercher de bonne heure à opérer.
D'ailleurs après avoir pratiqué la gastrotomie, soit pour extraire l'enfant, soit pour donner issue à
l'épanchement sanguin qui a pu résulter de la déchirure, et qui a pu ainsi déterminer cette opération,
il est nécessaire de faire dans le ventre des injections convenables, et de donner à la femme les mêmes soins
qu'exige l'opération césarienne.

Il serait sans doute beaucoup plus avantageux de prévenir la rupture de la matrice, que d'attendre
qu'elle ait lieu pour y remédier; mais qu'il nous soit permis de le dire ici, les signes rapportés par quelques
auteurs, comme indiquant, et faisant craindre cet accident, sont trop incertains pour déterminer à
l'opération césarienne, ou à terminer aussitôt l'accouchement d'autre manière. en effet il n'est point
d'accoucheur qui n'ait observé dans sa pratique, soit des contractions très vives, et même convulsives de la
matrice, sans aucun effet sur l'enfant, soit la tumescence du ventre, et de la région épigastrique, le hoquet
le vomissement, l'élevation du bris de la Matrice, l'allongement et le resserrement du Vagin, les
secousses violentes de l'enfant, une douleur assez vive vers la région épigastrique, ou dans quelque partie
de la Matrice, enfin la sensation subite du travail, sans que pour cela la rupture de la Matrice ait eue lieu.
Lors donc que ces symptômes paroissent, nous n'avons d'autres secours à leur opposer que ceux analogues
à la cause qui les produit. ainsi dans le cas où la vivacité et l'efficacité des douleurs dépendent de
l'irritabilité et de la puissance de l'individu, ou de celle des propres vaisseaux de la Matrice, lequel on peut
distinguer par l'état plethorique de la femme, et celui d'engorgement de rigidité et de chaleur du bris
et du vagin, alors les saignées du bras et du pied peuvent seules débarrasser l'organe des humeurs qui le
surchargent et embarrassent son mécanisme et son action. D'autres fois c'est l'irritation nerveuse
et l'étranglement spasmodique qui en est la suite, qu'il faut combattre, au moyen des relaxants
des bains, des calmants et même des narcotiques, soit que cet état dépende de la constitution nerveuse
et irritable de la femme, soit qu'il soit la suite des mauvaises Manœuvres de l'accoucheur. D'autres fois
la violence, et le peu d'efficacité des douleurs dépendent de la rupture prématurée des Membranes, ou
quelquefois de la rigidité et de l'épaisseur de leur tissu. Dans le premier cas, le repos, les calmants, et
quelquefois la saignée surtout lorsque le ventre est sensible et douloureux, apportent les changements
favorables, tandis que dans le second cas la rupture des membranes est le seul secours que l'on doive
mettre en usage. D'autres fois loin d'avoir à réprimer les forces de la nature, on est au contraire obligé
de les féconder, et de revivifier son énergie par l'emploi des fortifiants et même des fœtidaux, si l'écou-
lement de l'urine est interrompu et la salivité de l'orifice, ou de quelques brèches dans le vagin, alors il faut se relâcher
au moyen des injections muqueuses, et même y faire les incisions et autres opérations nécessaires. En-
fin l'extraction de l'enfant par les pieds, l'application des instruments, l'opération césarienne, et
quelquefois la section des pubis sont les secours aux quels l'on est de recourir dans le mauvais écoulement du

fets, ou quelques vices ^{de son organisation}, ou des accidents imprévus et formidables, tels qu'une
 perte, des convulsions, ^{ou en fin} la déféculation plus ou moins grande, de quelques parties du bassin. Le ca-
 quoiqu'il en soit aux différentes circonstances que nous venons d'énumérer, on peut encore joindre l'hémorragie
 utérine, qui résulte du décollement du placenta, sans que les Membranes se déchirent en aucune manière. La
 réalité de cet accident est confirmée par une observation du célèbre Albinus qui remarqua à l'ouverture du
 cadavre d'une femme qui périt dans l'avortement, que le placenta était séparé de la Matrice, dans presque
 toute son étendue, tandis que les Membranes étaient encore intactes, en sorte que le sang qui s'était épanché entre
 elles et la Matrice, était contenu par le contour des membranes encore adhérentes. Il serait difficile d'assigner
 la cause de cet Evénement, à moins de l'attribuer à quelques coups reçus sur la matrice, ou à quelques secousses
 violentes excitées par le travail ou un éternuement attenant à un vomissement considérable, par où alors la portion
 du placenta la moins adhérente peut perdre de sa cohésion, et le sang s'épanchant dans cet endroit, sans
 s'y accumuler de proche en proche, et déterminer ainsi une plus grande déchirure, et
 même cause dans l'intérieur de la Matrice, un épanchement d'autant plus funeste que souvent on
 ne peut le reconnoître qu'après l'avortement. On peut cependant soupçonner cet état, lorsqu'il survient
 tout à coup à la malade des foiblesses fréquentes, sans qu'on apperçoive le sang couler au dehors, et lorsque
 la matrice présenterait une élévation et un volume plus considérable qu'elle n'avait auparavant.
 ce sont sans doute ces signes d'ailleurs équivoques qui déterminèrent Mr. Boy (A) d'avorter son
 épouse. Il eût été à désirer que cet auteur nous eût plus amplement instruits des progrès du travail
 et de l'état de la malade. voici comme il s'exprime à l'article Sortes internes Mon Epouse
 11. l'eut courée dans ce cas, et serait morte si j'étais arrivé cinq minutes plus tard, je portai aussitôt la
 11. Main dans la matrice. le sang accumulé sortit en abondance, elle revint dès l'instant de la syncope.
 11. j'eus appliqué sur le tampon. elle n'eut pas la suite aucun accident. l'enfant presque à terme était mort.
 11. cela ne pouvait être autrement. cet accident était la suite d'un toux, à laquelle elle était très
 11. sujette dans ses grossesses.

D'après ce récit, il est évident qu'il y avait épanchement dans l'intérieur de la Matrice, mais
 l'hémorragie n'adviestait-elle point auparavant, avait-elle paru extérieurement? Les causes étaient-elles exclues?
 quels étaient les secours qu'on avait employés. Le tampon appliqué à l'orifice, que la compression pas l'été de
 fets pouvoient produire l'arrêt du sang, et déterminer son épanchement dans la matrice, ainsi que nous
 l'avons précédemment remarqué. tous ces éclaircissemens manquent dans l'observation de Mr. Boy. mais quelque
 soit la cause de l'épanchement dont il parle, il est certain qu'on ne peut dans cette circonstance fautive, faire
 l'avis à la Mere et à l'enfant, qu'en déterminant promptement la contraction de la matrice, et en terminant
 l'avortement.

Telles sont les principales causes des hémorragies utérines pendant l'avortement, et les
 différentes ressources qu'il faut leur opposer. dans le détail que nous venons d'en faire, j'espère
 nous avoir heureusement saisi et sagement indiqué les circonstances ou les différents secours
 les plus convenables et les plus sûrs, pour conserver à la patrie des citoyens, et des mères qui lui
 payent un tribut si précieux. *Bonmieu* Ch. à Justin département des
 Côtes du Nord.

87. n.